



III Congresso On-line Nacional
de Clínica Veterinária de
Pequenos Animais

HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA TRAUMÁTICA

ALICE ELISA PIZZUTTI; LUIZA FRUETT M. DE LIMA; LEONARDO SMIDERLE MACIEL;
MARIA EDUARDA STRAPAZZON; EDUARDA BORGES AMARANTE

INTRODUÇÃO: Hérnia diafragmática refere-se a protrusão de conteúdo abdominal para o tórax devido a anormalidade no diafragma. O extravasamento dos órgãos pode comprimir os lobos pulmonares comprometendo a ventilação. O diagnóstico pode ser feito pela história, sinais clínicos, exame físico e de imagem. **OBJETIVO:** Relatar atendimento emergencial ruptura traumática do diafragma, técnica cirúrgica utilizada para reparo e evolução do paciente. **RELATO DE CASO:** Foi atendido no Hospital Veterinário da UPF (Universidade de Passo Fundo) um canino, macho, Husky, 6 meses e 12kg, dispneico, para atendimento de emergência após atropelamento. Realizou-se exames para avaliação do estado geral do paciente e exame de raio x para avaliação de tórax, onde confirmou-se diagnóstico de hérnia diafragmática. Logo, foi encaminhado para procedimento cirúrgico de herniorrafia diafragmática. Foi feita incisão pré-umbilical de pele, subcutâneo e linha alba, e após, identificou-se localização da ruptura diafragmática radial no lado direito. Foi necessário remover conteúdo do estômago para acomodar os órgãos anatomicamente. Realizou-se sutura contínuo simples e nylon 2-0 no diafragma, onde no último ponto foi inflado o pulmão para obter pressão negativa. Logo, foi realizado gastropexia na parede abdominal direita com nylon 2-0 e contínuo simples. Para síntese de subcutâneo utilizou-se PDS 2-0, e para dermorrafia Wolf e nylon 3-0. Foi realizado toracocentese para drenagem de ar presente na pleura, para maior garantia de obter pressão negativa. Após acordar da anestesia o canino foi encaminhado para internação no CTI em observação. O paciente apresentou-se alerta, sem dispneia, se alimentou e seguiu se recuperando no pós operatório. Foi feita prescrição endovenosa de meloxicam, tramadol + buscopam, e Cefalotina. Após alguns dias o paciente apresentou boa recuperação e logo teve alta médica. **DISCUSSÃO:** É comum ocorrência de emergências traumáticas e importante ter conhecimento de técnica e procedimentos para fazer o reparo o mais rápido possível, visto que a enfermidade interfere na oxigenação que é vital para o paciente. **CONCLUSÃO:** A herniorrafia diafragmática foi eficaz para o reparo, visto que após o procedimento houve boa recuperação. É importante salientar a importância do estado geral de saúde do animal, que interfere diretamente na recuperação do paciente.

Palavras-chave: Técnica cirúrgica, Diafragma, Emergência, Trauma, Canino.