



III Congresso On-line Nacional
de Clínica Veterinária de
Pequenos Animais

IMPORTÂNCIA DO MONITORAMENTO CLÍNICO-LABORATORIAL E TERAPÊUTICO EM CÃO DOENTE RENAL CRÔNICO ESTÁGIO III CLINICAMENTE ESTÁVEL - RELATO DE CASO

LUISA LIMA NANTES DE OLIVEIRA; ANA LAURA FREITAS ALENCAR; MYLENNIA IVINA
ALMEIDA FERREIRA; JESSYANE MAGALHÃES DE MATOS; ANDRÉ LUIZ BAPTISTA
GALVÃO

INTRODUÇÃO: A Doença Renal Crônica (DRC) é uma enfermidade que induz a distúrbios sistêmicos causados pela perda gradual e não regenerativa da função renal. A DRC é dividida em estágios, no estágio 1, a creatinina sérica está inferior a 1,4mg/dL, a poliúria e polidipsia podem estar presentes, bem como a isostenúria reflexo da perda da capacidade de concentração da urina; valores séricos de creatinina entre 1,4mg/dL e 2,0mg/dL classificam o paciente no estágio 2, com a presença da poliúria, polidipsia e isostenúria; valores séricos de creatinina entre 2,1mg/dL e 5,0mg/dL enquadram o paciente no estágio 3 da DRC, com sinais clínicos de síndrome urêmica evidentes como vômito, anorexia e melena, além da poliúria, polidipsia e isostenúria; já valores acima de 5mg/dL de creatinina sérica classificam o paciente no estágio 4, com sinais clínicos graves de síndrome urêmica. A DRC é subclassificada quando presente a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e proteinúria. Pacientes com DRC necessitam de monitoramento clínico e laboratorial constante, com o emprego da terapia adequada. **OBJETIVOS:** Objetiva-se abordar a condição de DRC estágio 3 em um cão clinicamente estável, visando a importância do seu acompanhamento periódico, resultando em qualidade de vida e sobrevida. **RELATO DE CASO:** Atendeu-se um cão, macho, inteiro, raça Pitbull de dez anos de idade e 22kg, clinicamente estável com DRC estágio 3. O paciente está em acompanhamento bimestral de modo clínico, laboratorial e terapêutico, com resposta satisfatória de duração em 10 meses. Os valores séricos de creatinina permanecem estáveis em 3.5mg/dL, com apresentação clínica apenas de poliúria e polidipsia, ademais o paciente apresenta sucesso no controle da HAS em 140mmHg. A terapia do paciente envolve a hidratação por via oral, uso de dieta comercial renal, emprego de enalapril e suplementação oral com ômega 3 e complexo B. **DISCUSSÃO:** Pacientes no estágio 3 da DRC, apresentam sinais clínicos como vômito, anorexia e melena, além da poliúria, polidipsia e isostenúria. Embora, quando submetidos ao tratamento adequado, a estabilização clínica do paciente é possível, como evidenciado no presente relato. **CONCLUSÃO:** Paciente em estágio avançado da DRC quando submetido ao tratamento e acompanhamento possui qualidade de vida e sobrevida.

Palavras-chave: Creatinina, Hipertensão arterial sistêmica, Poliúria, Polidipsia, Proteinúria.