



III Congresso On-line Nacional
de Clínica Veterinária de
Pequenos Animais

SHIH-TZU SUBMETIDO À CESARIANA POR APRESENTAR FETO COM ANASARCA

CAMILLE POMPEU CLEMENTE DE ALMEIDA; YAGO MARQUES OLIVEIRA

INTRODUÇÃO: A anasarca fetal é caracterizada pelo edema generalizado do tecido subcutâneo, pela ampliação excessiva do feto, e consequentemente, pela distorcia obstrutiva durante o parto. Sua etiologia não foi elucidada, porém, acredita-se existir relação da anasarca fetal com genes autossômicos recessivos, malformações congênitas e consanguinidade. **OBJETIVOS:** O objetivo deste trabalho é relatar o caso de uma cadela, shih-tzu de 3 anos que foi submetida a procedimento de cesárea por apresentar dificuldade durante o parto de um feto que apresentava anasarca. **RELATO DE CASO:** Paciente estava sendo acompanhado por veterinária pois o mesmo desenvolveu uma gestação fruto de um cruzamento consanguíneo. Nos exames ultrassonográficos de acompanhamento já havia sido sugerida a presença de 3 fetos, porém um deles possivelmente apresentava anasarca, sendo sugerido o planejamento para realização de cesárea programada, porém, mesmo assim, tutora optou por tentar parto por meios naturais. Paciente foi encaminhado para atendimento cirúrgico por estar tendo dificuldades durante o parto do último feto, justamente o que apresentava anasarca. Foi submetido então à anestesia inalatória para realização de cesárea. Ao ser realizado o procedimento observou-se a presença de um único feto com tamanho desproporcional ao canal do parto e que apresentava edema generalizado. Durante a avaliação observou-se que o feto estava inviável e que o tecido uterino já apresentava alterações características de infecção. **DISCUSSÃO:** Corroborando com o que trata a literatura, o caso apresenta um paciente de raça shih-tzu que apresentou cruzamento consanguíneo e subsequente a isto houve o desenvolvimento de 3 fetos, sendo que um deles apresentava anasarca. Ainda de acordo com as recomendações, foi realizado procedimento cirúrgico para remoção do feto que apresentava tamanho desproporcional por conta do seu acometimento. **CONCLUSÃO:** Concluímos com o relato que a conduta adotada, realizar o procedimento cirúrgico, foi correta, tendo em vista a incapacidade da cadela parir o feto acometido. Tal conduta trouxe benefícios para a cadela que teve completa recuperação.

Palavras-chave: Anasarca, Cesária, Consanguíneo, Feto, Edema generalizado.