



III Congresso On-line Nacional
de Clínica Veterinária de
Pequenos Animais

TUMOR VENÉREO TRANSMISSÍVEL METASTÁTICO COM NÓDULOS EM MUCOSAS, GENITÁLIA, DORSO E MEMBROS - RELATO DE CASO

CAMILLE POMPEU CLEMENTE DE ALMEIDA; YAGO MARQUES OLIVEIRA

INTRODUÇÃO: O Tumor Venéreo Transmissível (TVT) canino é uma neoplasia altamente transmissível, por meio da implantação de células tumorais durante a interação de animais portadores da doença, sobretudo pelo contato sexual. Sua manifestação clínica caracteriza-se pela presença de lesão ulcerativa, semelhante à uma couve-flor, na região urogenital (forma típica), bem como de nódulos em mucosas e pele (forma atípica). Além disso, pode ocorrer metástase cutânea como resultado de uma lesão traumática e/ou introdução mecânica de células tumorais no tecido cutâneo por meio de fômites. O prognóstico é considerado bom, com resposta satisfatória à quimioterapia.

OBJETIVOS: Logo, este trabalho objetivou relatar um caso de TVT canino, com nódulos característicos da enfermidade em diversas partes do corpo. **RELATO DE CASO:** Uma fêmea canina, 5 anos de idade, pesando 5,5 kg e com histórico de erliquiose, apresentou feridas no corpo e na boca. Após exame físico, constatou-se a presença de múltiplas lesões nodulares de tamanhos e de formatos variados, sendo algumas ulceradas, apresentando secreção serosanguinolenta, friáveis, com bordas espessas e inflamadas, e outras não ulceradas. As lesões localizavam-se nos membros pélvicos e torácicos, face, lábios, vulva, região inguinal, abdômen e ao longo de todo o dorso. Foi realizado hemograma e exame citológico com swab das lesões ulceradas cutâneas e vaginais, que confirmaram tratar-se de tumor venéreo transmissível. O protocolo terapêutico adotado constitui-se da administração de Ondansetrona (1,5mg/Kg; um comprimido duas horas antes e um comprimido quatro horas depois da sessão de quimioterapia); Promun Dog Tabs (½ comprimido, 30 dias); Vincristina (0,025mg/Kg). Foram realizadas sessões a cada 7 dias até completo desaparecimento dos tumores, totalizando 5 sessões.

DISCUSSÃO: O caso apresenta uma paciente canina com múltiplas lesões nodulares de tamanhos e de formatos diferentes por todo corpo. Ainda de acordo com as recomendações, foi solicitado hemograma e exame citológico com swab, que confirmou tratar-se de tumor venéreo transmissível. Subsequente a isto paciente foi submetido a tratamento clínico adequado, com sessões de quimioterapia e outras medicações para auxiliar no protocolo.

CONCLUSÃO: Concluiu-se que, apesar da presença de formações neoplásicas indicativas de metástase, o paciente respondeu bem à quimioterapia empregada e não obteve recidiva das lesões.

Palavras-chave: Neoplasia, Tvt, Metástase, Lesões nodulares, Quimioterapia.