



GRANULOMATOSE COM POLIANGEÍTE: INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E MANIFESTAÇÕES OTORRINOLARINGOLÓGICAS

ANA DANIELE QUEIROZ DE MEDEIROS; VICTOR DE GIOIA; RENATA IVANILDE DA MATA BORGES; GABRIELI WATERKEMPER DE LIMA

Introdução: A Granulomatose com Poliangite (GPA), uma vasculite sistêmica rara, pode desencadear graves manifestações otorrinolaringológicas que exigem intervenções cirúrgicas. As manifestações variam de sinusite crônica a perda auditiva e estenose subglótica, impactando significativamente a qualidade de vida dos pacientes. **Objetivo:** Esta revisão sistemática busca analisar as intervenções cirúrgicas e as manifestações otorrinolaringológicas em pacientes com GPA, com base em evidências científicas recentes. **Metodologia:** Seguindo as diretrizes do checklist PRISMA, realizamos uma busca sistemática nas bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science. Os descritores utilizados foram "Granulomatose com Poliangite", "intervenções cirúrgicas", "manifestações otorrinolaringológicas", "tratamento" e "complicações". Foram incluídos estudos de caso e séries de casos publicados nos últimos dez anos, envolvendo pacientes com diagnóstico confirmado de GPA e que passaram por procedimentos cirúrgicos otorrinolaringológicos. Excluíram-se estudos não relacionados a intervenções cirúrgicas, artigos sem dados clínicos específicos e estudos em animais. **Resultados:** Septoplastia: Correção do desvio de septo nasal, visando melhorar a respiração e reduzir a frequência de sinusites. Timpanoplastia: Reconstrução do tímpano danificado por otite média crônica, com o objetivo de restaurar a audição. Cirurgias para correção de estenose subglótica: Alargamento da via aérea superior, essencial para aliviar a dispneia e prevenir a asfixia. As manifestações otorrinolaringológicas mais frequentes em pacientes com GPA incluíram: Sinusite crônica: Inflamação crônica dos seios da face, caracterizada por congestão nasal, secreção purulenta, dor facial e cefaleia. Otite média crônica: Infecção persistente do ouvido médio, podendo levar à perda auditiva e à perfuração do tímpano. Perda auditiva: Redução da capacidade de ouvir sons, podendo ser causada por danos ao ouvido interno ou médio. **Conclusão:** As manifestações otorrinolaringológicas na GPA são comuns e podem necessitar de múltiplas intervenções cirúrgicas. A identificação precoce e o manejo adequado dessas manifestações, em conjunto com o tratamento sistêmico da GPA, são essenciais para melhorar os desfechos cirúrgicos, prevenir complicações e garantir uma melhor qualidade de vida para os pacientes.

Palavras-chave: GRANULOMATOSE COM POLIANGEÍTE; INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS; MANIFESTAÇÕES OTORRINOLARINGOLÓGICAS; TRATAMENTO; COMPLICAÇÕES