ENXERTO DE TECIDO CONJUNTIVO: GANHO DE MUCOSA QUERATINIZADA E ALTERAÇÃO DE FENÓTIPO GENGIVAL

BIANCA RAFAELI PIOVEZAN; LARA TESCHI BRAVO; OTAVIO AUGUSTO PACHECO VITORIA; HALEF DIEGO TURINI; JULIANO MILANEZI DE ALMEIDA

Intrudução: A gengiva inserida se caracteriza pela faixa de tecido limitada pela ranhura gengival livre e pela linha mucogengival. Em periodontia, tem sido sugerido por alguns autores que a presença de uma gengiva queratinizada inserida com largura de 2 mm ou mais é um fator importante para a saúde periodontal. **Objetivo:** relatar um caso clínico de enxerto de tecido conjuntivo pela técnica da tunelização para ganho de mucosa queratinizada. Paciente do gênero feminino, 20 anos, compareceu na clínica de pós-graduação da FOA/UNESP e, ao exame clínico foi observado pouca faixa de tecido queratinizado. No exame radiográfico foi verificado uma descontinuidade da lâmina dura alveolar. Foi realizada uma incisão mucoperiosteal perpendicular à linha mucogengival abaixo do elemento 43. **Relato de Caso:** Foi realizada a tunelização, partindo da região distal do 43 até a mesial do 32. Um enxerto livre foi removido do palato pela técnica bilaminar. O enxerto de tecido conjuntivo foi acomodado na área receptora (túnel) por meio de suturas específicas. O epitélio foi devolvido para a área doadora para a estabilização do coágulo e maior conforto pós operatório. **Resultados**: No pós operatório de 7 dias notou-se bom aspecto cicatricial e a paciente relatou estar assintomática. O acompanhamento permaneceu até o décimo segundo mês, após a cirurgia. **Discussão:**Foi observado um aumento da faixa de mucosa queratinizada, bem como o aumento de volume da região em questão, atendendo as expectativas da paciente. **Conclusão**: a técnica da tunelização, associada ao enxerto de tecido conjuntivo é uma opção terapêutica eficaz para o ganho de mucosa queratinizada e volume gengival, corroborando com os achados na literatura.

Palavras-chave: Mucosa queratinizada, Fenotipo gengival, Volume tridimensional, Enxerto autógeno, Tecido conjuntivo.

DOI: 10.51161/conaclil/10948