

FATORES ASSOCIADOS A ANEMIA FERROPRIVA EM CRIANÇAS NO BRASIL: REVISÃO NARRATIVA

LILIAN HEIDRIAN LIMA BASTOS; ERNANI WILSON MAIA CARNEIRO FILHO;
HERMINIO DE SOUSA LIMA

INTRODUÇÃO: A anemia é uma patologia de problemas mundiais com muitas causas e consequências. Segundo estatísticas da Organização Mundial da Saúde (OMS), 20% das crianças de 6 a 59 meses de idade são afetadas. No Brasil, analisaram que 20,9% das crianças menores de 5 anos apresentavam esta doença. **OBJETIVO:** Este trabalho visa sintetizar as informações sobre " Fatores associados associados a anemia ferropriva em crianças no Brasil ~". A anemia ferropriva é um diagnóstico frequente. Conhecer os fatores de risco associados a aparição desta enfermidade ajudará a buscar maneiras de promover la disminución destes. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Trata-se de um estudo de revisão sistemática narrativa. Uma revisão bibliográfica foi feita utilizando como metodologia a coleta de dados em artigos científicos, dissertações y sites em português, disponível em bases de dados, tais como: Biblioteca Virtual de Saúde, Repositórios Acadêmicos, Google Scholar e Scielo, dos anos de 2004-2022. **RESULTADOS:** No século 20, a anemia ferropénica na infância é muito frequente. No período de 2020, foi constatado que a região de maior risco de prevalência da enfermidade foi o Sudeste, enquanto no Sul o risco foi menor. Um estudo de metanálise realizado em 2021 revelou que em indivíduos do sexo masculino, com idade inferior a 24 ou 36 meses, baixo peso ao nascer e, adicionalmente, associada a família de baixa escolaridade dos pais e menor poder aquisitivo, tem maiores riscos. A taxa de ocorrência de anemia teve uma redução significativa ao longo de um período de 13 anos, diminuindo de 20,9% em 2006 para 10,0% em 2019. A região Sudeste teve a maior redução, com uma diminuição absoluta de 14,7%, enquanto a região Centro-Oeste teve a menor redução, com uma diminuição absoluta de 1,6%. **CONCLUSÃO:** A anemia é uma patologia global com múltiplas causas e consequências. A região Sudeste apresentou a maior redução na prevalência ao longo de 13 anos. Há Alguns fatores de risco importantes como baixa escolaridade dos pais e menor poder aquisitivo. É necessário continuar buscando formas de reduzir os fatores de risco associados à anemia ferropriva e melhorar a atenção primária.

Palavras-chave: Anemia ferropriva, Fatores de risco, Ferro, Atenção primária, Crianças.