

BOCIO MULTILOBULAR TÓXICO: SINTOMAS E CONDUTA CIRÚRGICA

MARIA EDUARDA EVANGELISTA RESENDE; HELENA DINIZ OLIVEIRA; CÁSSIA GABRIELA ASSUNÇÃO MORAES; CENDI SOARES SILVEIRA; IGOR COSTA SANTOS

INTRODUÇÃO: O bócio multilobular tóxico é uma manifestação da disfunção tireoidiana que envolve o crescimento anormal da glândula tireoide, resultando em múltiplos nódulos que produzem excesso de hormônios tireoidianos. Essa condição, muitas vezes associada a sintomas de hipertireoidismo, demanda atenção clínica e intervenção terapêutica para mitigar os sintomas e tratar possíveis complicações. Esta revisão explora os sintomas clínicos característicos do bócio multilobular tóxico e investiga a conduta cirúrgica como uma abordagem terapêutica. **OBJETIVOS:** compreender os principais sintomas apresentados pelos pacientes com bócio multilobular tóxico e explorar a eficácia da conduta cirúrgica como opção terapêutica. **METODOLOGIA:** seguiu as diretrizes do checklist PRISMA. As bases de dados selecionadas foram PubMed, Scielo e Web of Science. A busca utilizou descritores como "multinodular goiter", "toxic thyroid adenoma", "surgical treatment", "symptoms", "thyrotoxicosis". Critérios de Inclusão: Estudos publicados entre 2013 e 2023, pacientes diagnosticados com bócio multilobular tóxico confirmado por exames de imagem e testes hormonais, estudos que avaliam sintomas clínicos, abordagens terapêuticas clínicas ou cirúrgicas. Critérios de Exclusão: Estudos que não focam em bócio multilobular tóxico, estudos com amostras pequenas (menos de 10 participantes). Estudos com abordagens terapêuticas não relacionadas à conduta cirúrgica ou clínica. **RESULTADOS:** Foram selecionados 17 artigos. A revisão sistemática revelou que o bócio multilobular tóxico é frequentemente associado a sintomas como taquicardia, palpitações, perda de peso, ansiedade, tremores e intolerância ao calor, devido à produção excessiva de hormônios tireoidianos pelos nódulos hiperfuncionantes. A conduta cirúrgica, incluindo tireoidectomia subtotal ou total, emergiu como uma opção eficaz para pacientes com sintomas graves ou quando não houve resposta adequada ao tratamento medicamentoso. **CONCLUSÃO:** Esta revisão sistemática aborda sintomas e conduta cirúrgica em pacientes com bócio multilobular tóxico. A análise detalhada dos sintomas clínicos e das opções terapêuticas cirúrgicas fornece insights valiosos para profissionais de saúde envolvidos no manejo desses pacientes. A conduta cirúrgica se mostra uma abordagem eficaz, mas a decisão deve ser feita considerando a individualidade do paciente e os riscos associados à cirurgia. Essa revisão contribui para a compreensão aprofundada do bócio multilobular tóxico e suas implicações clínicas.

Palavras-chave: Multinodular goiter, Toxic thyroid adenoma, Surgical treatment, Symptoms, Thyrotoxicosis.