

ARTRITE IDIOPÁTICA JUVENIL: AVALIAÇÃO CLÍNICA E DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS EM PEDIATRIA

GABRIEL FAYAD CAMPOS; PEDRO PAULO DIAS DE SÁ; LUCAS PEIXOTO SUDÉRIO;
VANESSA ISRAEL DE SOUZA ASSUNÇÃO; IGOR COSTA SANTOS

INTRODUÇÃO: A artrite idiopática juvenil (AIJ) é uma condição crônica inflamatória que afeta as articulações de crianças e adolescentes, apresentando uma ampla gama de manifestações clínicas. A natureza heterogênea dessa doença torna a avaliação clínica precisa e o estabelecimento de diagnósticos diferenciais vitais para um manejo eficaz. A identificação precoce, tratamento adequado e diferenciação de outras condições com sintomas similares são cruciais para melhorar a qualidade de vida e minimizar o impacto da AIJ em pacientes pediátricos. **OBJETIVOS:** explorar a literatura científica disponível sobre a avaliação clínica da artrite idiopática juvenil e os diagnósticos diferenciais relevantes em pediatria. **METODOLOGIA:** A revisão sistemática foi conduzida em conformidade com as diretrizes do PRISMA. As bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science foram exploradas para identificar artigos científicos, estudos clínicos e revisões. Os descritores utilizados incluíram "juvenile idiopathic arthritis", "clinical evaluation", "diagnostic criteria", "pediatric rheumatology" e "differential diagnosis". Critérios de Inclusão: Estudos publicados nos últimos 10 anos; abordagem da avaliação clínica da artrite idiopática juvenil em pacientes pediátricos; investigação de diagnósticos diferenciais associados à AIJ; português ou espanhol e estudos envolvendo pacientes com diagnóstico de AIJ. Critérios de Exclusão: estudos não relacionados à avaliação clínica ou diagnósticos diferenciais da AIJ em crianças; estudos publicados antes de 2013 e estudos em idiomas diferentes dos mencionados anteriormente. **RESULTADOS:** Foram selecionados 15 artigos. A literatura examinada abordou uma variedade de abordagens clínicas para a avaliação da AIJ em crianças, incluindo a análise de sintomas articulares, exames físicos, exames laboratoriais e critérios diagnósticos específicos. Os diagnósticos diferenciais relevantes incluíram outras condições reumáticas inflamatórias, infecções articulares e distúrbios autoimunes. A revisão destacou a importância da avaliação abrangente e da análise cuidadosa dos sintomas para diferenciar entre essas condições. **CONCLUSÃO:** A avaliação clínica da artrite idiopática juvenil e os diagnósticos diferenciais em pediatria são elementos essenciais para um diagnóstico preciso e um manejo eficaz. A revisão sistemática ressaltou a importância de abordagens clínicas detalhadas, conhecimento profundo dos critérios diagnósticos e conscientização sobre as condições que se assemelham à AIJ.

Palavras-chave: Juvenile idiopathic arthritis, Clinical evaluation, Diagnostic criteria, Pediatric rheumatology, Differential diagnosis.