



ANÁLISE FUNCIONAL DA TÉCNICA DE LIPOASPIRAÇÃO NA REDUÇÃO DE GORDURA SUBMENTUAL NO CONTEXTO DA CIRURGIA PLÁSTICA

ROBERTO MACEDO CRUZ; RONALD PINTO COSTA; LUANA RIGO GOMES; LORENA MELO MOURA SILVA; TAINÃ MAGALHÃES DE OLIVEIRA BERTOLLO

INTRODUÇÃO: O acúmulo de gordura na região submental é um processo decorrente de fatores extrínsecos e intrínsecos ao indivíduo, como ganhos ponderais inadequados, características genéticas e envelhecimento natural. Embora não seja considerado um evento patológico, pode acarretar repercussões negativas em relação à autoimagem dos pacientes, sobretudo, pela perda da definição do ângulo cervicomentual. Nessa análise, a realização de lipoaspiração submental mostra-se como uma alternativa efetiva ao estabelecimento da harmonia da região cervical e do contorno mandibulofacial, por tratar-se de uma intervenção cirúrgica pouco invasiva e sob a utilização de anestesia local. **OBJETIVO:** Evidenciar a avaliação da lipoaspiração na redução de gordura submental e seus aspectos cirúrgicos. **METODOLOGIA:** Revisão bibliográfica, por meio de levantamentos de dados e pesquisas através de artigos entre o período de 2021 e 2022. **RESULTADOS:** A lipoaspiração se mostrou eficaz e capaz de promover um contorno do terço inferior condizente com um perfil mais jovem com uma procura predominante por mulheres. Trata-se de uma técnica minimamente invasiva, uma vez que as ramificações nervosas motoras situam-se mais profundas em relação a superfície adiposa, nessa lipoaspiração a remoção da gordura restringe-se região submentoniana, onde apenas remove-se a gordura supraplastimal. Porém, bons resultados, por vezes, não podem ser assegurados, já que a viabilização do procedimento em cada paciente depende de um exame físico adequado, pautado em elementos essenciais da fase pré-cirúrgica onde será avaliado a quantidade de deposição de gordura na área, o estado do platismo, a quantidade de pele redundante ou frouxidão do complexo derme-fáscia-músculo. As complicações são relatadas em somente 2% dos casos, sendo essas complicações de causas infecciosas, alérgicas, fibroses, equimoses, edemas persistentes, cicatrizes hipertróficas ou reações alérgicas aos materiais usados no procedimento. **CONCLUSÃO:** Portanto, nota-se que o processo de lipoaspiração tornou-se uma das escolhas mais viáveis para indivíduos que tiveram um acúmulo de gordura, independente de seus fatores desencadeantes, em busca de um rosto mais simétrico ou um rejuvenescimento cervical. Logo, a lipoplastia submentoniana enquadra-se como um procedimento eficaz e seguro, apesar do seu melhor retorno estético a partir de um acompanhamento especializado.

Palavras-chave: Cirurgia plástica, Gordura submental, Lipoaspiração, Lipoaspiração submental, Rejuvenescimento cervical.