



SIALOLITÍASE EM REGIÃO DE GLÂNDULA SUBMANDIBULAR RELATO DE CASO

BEATRIZ KELY PEREIRA GOMES; AMANDA VICTÓRIA VERISSIMO DA SILVA; KALINNY XAVIER DOMINGOS LOURENÇO; DÉBORA MARIA LAURENTINO; DARLAN KELTON FERREIRA CAVALCANTE

Introdução: Os cálculos salivares, comumente denominados de sialolitíase, são estruturas calcificadas que se desenvolvem dentro do sistema de ductos das glândulas salivares. Na maioria das vezes, o sialólito se desenvolve dentro do sistema ductal da glândula submandibular, representando cerca de 80% dos casos. O ducto que secreta saliva dessa glândula é denominado ducto de Wharton, o qual realiza um trajeto ascendente e tortuoso levando a saliva para cima, ocorrendo desta forma uma maior tendência à formação de cálculo salivar. Os sialólitos também podem se formar dentro das glândulas salivares menores e parótida, entretanto, é menos frequente (ROZAS M, et al., 2023). **Objetivo:** O presente estudo consiste em uma revisão narrativa de literatura, bem como, um relato de caso clínico, enfatizando o diagnóstico e os possíveis tratamentos, para a ocorrência de sialolitíase em região de glândula submandibular. **Relato de caso:** Paciente E.R.C, sexo masculino, 36 anos de idade, apresentando queixa de aumento de volume no assoalho da boca no lado esquerdo, dor e saída de secreção purulenta durante mastigação, ao exame radiográfico apresentou-se uma massa radiopaca com imagem sugestiva de sialólito em região de glândula submandibular. Durante tentativa de tratamento conservador não se obteve melhora nem saída do cálculo após ordenha e terapia sialogoga. Optou-se então, pela remoção cirúrgica do sialólito, paciente evoluiu bem, sem queixas e sem sinais de recidiva. A gravidade dos sintomas é variável, dependendo do grau de obstrução e da quantidade de pressão negativa produzida dentro da glândula. **Conclusão:** Conclui-se que a terapia cirúrgica se apresenta como alternativa viável e eficaz no tratamento de sialolitíase, principalmente em cálculos encontrados na porção final do ducto. Além disso, cálculos encontrados na porção inicial do ducto, bem como, dentro da glândula ou na presença de dano inflamatório da glândula acometida, esta também deverá ser removida.

Palavras-chave: Sialolitíase, Glândulas salivares, Ducto de wharton, Cálculo salivar, Tratamento.