



CIRURGIA CURATIVA DE ADENOCARCINOMA DE SIGMÓIDE

JOÃO ALFREDO SILVA PÁDUA; JULIANA BERNABÉ SILES; LÍVIA OLIVEIRA CAMPOS;
BRUNA VAZ DA SILVA; IGOR COSTA SANTOS

INTRODUÇÃO: O adenocarcinoma de sigmóide é uma forma comum de câncer colorretal e representa um desafio clínico significativo. A cirurgia curativa desempenha um papel fundamental no tratamento dessa doença, visando a remoção completa do tumor e a prevenção da recorrência. Nesta revisão, exploramos as abordagens cirúrgicas utilizadas no tratamento do adenocarcinoma de sigmóide, bem como os resultados clínicos associados. **OBJETIVOS:** analisar as opções cirúrgicas disponíveis para o tratamento curativo do adenocarcinoma de sigmoide, examinando os resultados relacionados à sobrevida, morbidade e qualidade de vida dos pacientes. **METODOLOGIA:** Esta revisão foi conduzida seguindo as diretrizes do PRISMA. A pesquisa foi realizada nas bases de dados PubMed, Embase e Scopus, utilizando os seguintes descritores: "adenocarcinoma de sigmoide", "cirurgia curativa", "prognóstico", "morbidade" e "sobrevida". Os critérios de inclusão compreenderam estudos publicados nos últimos 10 anos, artigos originais, revisões sistemáticas e estudos clínicos que abordassem as opções cirúrgicas para o tratamento curativo do adenocarcinoma de sigmoide. Foram excluídos estudos com amostras menores do que 50 pacientes e aqueles que não apresentavam resultados relevantes para o objetivo da revisão. **RESULTADOS:** Foram selecionados 18 artigos. A revisão da literatura revelou que as abordagens cirúrgicas mais comuns para o tratamento curativo do adenocarcinoma de sigmoide incluem a ressecção segmentar do sigmoide com anastomose primária, a ressecção segmentar do sigmoide com colostomia temporária e a ressecção segmentar do sigmoide com anastomose colônica protegida. A escolha da técnica cirúrgica depende de vários fatores, como a localização e o estágio do tumor, a condição clínica do paciente e a experiência do cirurgião. Além disso, a taxa de recorrência local é geralmente baixa quando a ressecção é realizada de maneira adequada. No entanto, complicações pós-operatórias, como deiscência da anastomose, sangramento e infecção, ainda podem ocorrer e exigem monitoramento e tratamento adequados. **CONCLUSÃO:** A cirurgia curativa desempenha um papel crucial no tratamento do adenocarcinoma de sigmóide, proporcionando a remoção completa do tumor e a prevenção da recorrência. As opções cirúrgicas, como ressecção segmentar do sigmoide com anastomose primária ou colostomia temporária, devem ser individualizadas para cada paciente, considerando características clínicas e o estágio da doença.

Palavras-chave: Adenocarcinoma de sigmoide, Cirurgia curativa, Prognóstico, Morbidade, Sobrevida.