



PRINCIPAIS CAUSAS DE ABDOME AGUDO PERFURATIVO

THIFFISSON RIBEIRO DE SOUZA; VICTÓRIA CÂNDIDO DA SILVA; VICTOR DA COSTA SACKSIDA VALLADÃO; ÁDILA GABRIELA COSTA DE ASSIS

Introdução: O abdome agudo perfurativo é uma emergência médica caracterizada pela presença de uma perfuração em qualquer parte do trato gastrointestinal, resultando em peritonite e potencial sepsis. Este quadro clínico exige diagnóstico rápido e intervenção cirúrgica imediata. A rápida identificação e tratamento das causas de abdome agudo perfurativo são cruciais para reduzir a morbidade e mortalidade associadas a esta condição. A abordagem inclui diagnóstico por imagem, como tomografia computadorizada, e intervenção cirúrgica emergencial para reparar a perfuração e tratar a peritonite. **Objetivo:** Apontar na literatura selecionada quais são as principais causas de abdome agudo perfurativo. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa de literatura que utilizou artigos publicados nos últimos 5 anos na base de dados PUBMED, preferencialmente em inglês, português, espanhol e francês. Para a filtragem, utilizou-se o Descritor em Ciências da Saúde (DeCS) "*acute abdome*", onde apenas 41 de 3076 artigos foram selecionados, além de livros referência da medicina. **Resultados:** Após minuciosa revisão de literatura, percebeu-se que as principais causas de abdome agudo perfurativo incluem úlcera péptica perfurada, diverticulite complicada, apendicite aguda perfurada e trauma abdominal. A úlcera péptica perfurada ocorre quando uma úlcera no estômago ou no duodeno penetra todas as camadas da parede gastrointestinal, liberando conteúdo gástrico no peritônio, causando inflamação intensa. Esta condição frequentemente está associada ao uso de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) e infecção por *Helicobacter pylori*. A diverticulite complicada, que envolve a inflamação dos divertículos intestinais, pode levar à perfuração quando não tratada adequadamente. O extravasamento de fezes e bactérias para a cavidade abdominal resulta em peritonite e potencial formação de abscessos. Apendicite aguda, se não tratada precocemente, pode evoluir para perfuração, especialmente em casos de diagnóstico tardio. A perfuração apendicular leva à disseminação de material fecal e bacteriano na cavidade peritoneal, causando inflamação difusa. O trauma abdominal, tanto fechado quanto penetrante, é outra causa significativa de perfuração visceral. Lesões resultantes de acidentes automobilísticos, quedas ou feridas por arma de fogo podem levar à ruptura de órgãos abdominais e consequente peritonite. **Conclusão:** As principais causas de abdome agudo perfurativo incluem: úlcera péptica perfurada, diverticulite complicada, apendicite aguda perfurada e trauma abdominal.

Palavras-chave: úlcera péptica perfurada, Apendicite, Diverticulite, Causalidade, Peritonite.