



SANGRAMENTO VAGINAL NO DIAGNÓSTICO DE ADENOCARCINOMA ENDOMETRIAL: UM RELATO DE CASO

CASSYO VINICIOS THOMAZ

INTRODUÇÃO: O câncer de endométrio é uma neoplasia maligna ginecológica frequente em mulheres com idade superior a 50 anos. No mundo o câncer de corpo uterino é a segunda neoplasia ginecológica mais incidente, com 7.840 novos casos, segundo estimativas do INCA, em 2023. Esse relato aborda um caso de adenocarcinoma endometrial no qual o sangramento vaginal pós-menopausa foi um ponto chave para a investigação e posterior diagnóstico. **OBJETIVOS:** Relatar um caso de adenocarcinoma endometriode invasor do endométrio em uma paciente de 62 anos. **RELATO DE CASO:** Paciente feminina, 62 anos, com hábitos tabagistas a 23 anos atrás com carga tabágica de 11,5 maços/ano, nega etilismo, menopausa aos 50 anos, com história de hipertensão arterial sistêmica sem tratamento. No ambulatório queixou-se de sangramento vaginal há alguns meses. Foi solicitada uma ultrassonografia transvaginal que apresentou espessamento endometrial de 26 mm e útero medindo 354,4 cm e marcador tumoral CA 125 a 34,8 U/ml, resultados sugestivos de câncer de endométrio. Sugeriu-se tratamento cirúrgico que constituiu em cirurgias de estadiamento, histerectomia total e linfadenectomia pélvica. O exame anatomopatológico revelou adenocarcinoma endometriode invasor do endométrio, extenso de grau histológico 2 segundo a classificação FIGO, com invasão de 80% da espessura do miométrio e infiltrando colo uterino e istmo. Foi solicitada TFD para radioterapia adjuvante que ainda não foi aprovada. **DISCUSSÃO:** Aproximadamente 90% das pacientes diagnosticadas com câncer de endométrio tem como sintoma o sangramento vaginal anormal. O tipo mais comum deste câncer é o adenocarcinoma endometrióide que é derivado de células glandulares epiteliais secretoras do endométrio. Na maioria dos casos o diagnóstico é realizado após a cirurgia, pois a cirurgia estadiadora é feita em conjunto com a curativa por meio da histerectomia total, sendo o estadiamento o fator prognóstico mais importante nesta neoplasia. **CONCLUSÃO:** O aspecto mais relevante no caso apresentado é observar a importância da investigação de câncer do endométrio em situações que a paciente relata sangramento vaginal pós menopausa, por este ser o sintoma mais comum desse tipo de neoplasia maligna.

Palavras-chave: Sangramento vaginal, Câncer de endométrio, Adenocarcinoma endometriode, Neoplasia ginecológica, Menopausa.