

ATRESIA DE ESOFAGO EM NEONATOS: UMA AVALIAÇÃO CLÍNICA E CONDUTA CIRÚRGICA

IGOR COSTA SANTOS; BERNARDO MACHADO BERNARDES; ANA ELISA SANDES
BARBOSA MACHADO; MARIA EDUARDA SOARES TAVEIRA; DANIELLA GOMES
RODRIGUES DE MORAIS

Introdução: A atresia de esôfago é uma condição médica rara e grave que afeta neonatos, representando uma anomalia congênita do esôfago. Essa condição é caracterizada por uma interrupção na continuidade do esôfago, impedindo a passagem adequada dos alimentos da boca para o estômago. Como resultado, a atresia de esôfago é uma emergência médica que requer avaliação clínica imediata e intervenção cirúrgica para corrigir a obstrução e permitir a alimentação normal do recém-nascido. **Objetivos:** sintetizar estudos científicos publicados nos últimos 10 anos sobre a atresia de esôfago em neonatos, com foco na avaliação clínica da condição e nas diferentes condutas cirúrgicas empregadas no tratamento. **Metodologia:** Para conduzir esta revisão, adotamos as diretrizes do PRISMA. Realizamos uma busca abrangente nas bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science, utilizando os seguintes descritores: "atresia de esôfago", "neonatos", "avaliação clínica", "conduta cirúrgica" e "resultados clínicos". A busca foi restrita a artigos publicados nos últimos 10 anos. Critérios de Inclusão: estudos publicados nos últimos 10 anos que abordam a atresia de esôfago em neonatos, pesquisas que investigam a avaliação clínica da condição, métodos de diagnóstico, opções cirúrgicas e desfechos clínicos. Critérios de Exclusão: estudos que não se concentram diretamente na atresia de esôfago em neonatos, pesquisas com amostras muito pequenas que não permitam uma análise significativa. **Resultados:** foram selecionados 15 estudos. A revisão sistemática identificou um conjunto de estudos que abordam diversos aspectos da atresia de esôfago em neonatos. Os resultados encontrados incluem avanços na avaliação clínica da condição, incluindo métodos de diagnóstico mais precisos, além de diferentes abordagens cirúrgicas utilizadas para corrigir a atresia. **Conclusão:** A atresia de esôfago em neonatos é uma condição médica grave que requer diagnóstico precoce e intervenção cirúrgica imediata. Esta revisão sistemática da literatura destacou a importância da avaliação clínica precisa da condição e das diferentes abordagens cirúrgicas empregadas no tratamento. A identificação precoce e a conduta cirúrgica apropriada são cruciais para melhorar os desfechos clínicos e a qualidade de vida dos recém-nascidos afetados por essa condição rara, mas significativa.

Palavras-chave: Atresia de esôfago, Neonatos, Avaliação clínica, Conduta cirúrgica, Resultados clínicos.