



PREVALÊNCIA DE CANDIDÍASE EM GESTANTES ATENDIDAS EM UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ, RONDÔNIA

KAHYNA MARIA BATISTA TENÓRIO; KAHYNA MARIA BATISTA TENÓRIO

Introdução: O gênero *Cândida* faz parte da flora normal do trato urogenital do ser humano, porém quando ocorre um desequilíbrio no sistema imunológico do indivíduo, ocorre também um desequilíbrio na flora normal, tendo como possível consequência uma desordem na proliferação de alguns micro-organismos fazendo com que se desenvolvam algumas patologias específicas. **Objetivos:** O presente estudo teve como objetivo analisar a presença da infecção por *Cândida albicans* em gestantes que fazem acompanhamento de pré-natal em uma unidade básica de saúde do município de São Miguel do Guaporé. **Metodologia:** Após aprovação do projeto no Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos sob o protocolo nº1.44129/2015, foram utilizados para identificação dos fungos os exames de bacterioscopia, direto á fresca, e semeadura em Agar *Sabouraud* e para a classificação da espécie *Cândida albicans* foi utilizado o teste de tubo germinativo. Para obtenção das amostras foram coletadas secreção vaginal pelas próprias gestantes, após uma palestra sobre o tema e a realização da coleta, assinatura do termo de consentimento esclarecido e obtiveram para a coleta um swab estéril, um tubo contendo 9 ml de solução fisiológica estéril e uma (1) lâmina devidamente higienizada. Após o termino de cada coleta as amostras foram acondicionadas em local apropriados e encaminhadas para o laboratório de microbiologia do CEULJI/ULBRA, (Ji-paraná) onde foram dado início aos procedimentos técnicos. **Resultados:** foram coletadas e analisadas 50 amostras, de gestantes entre 18 a 44 anos, entre as análises 18 amostras foram identificadas como *Candida albicans* e 12 *Cândida não-albicans*, totalizando 30 amostras positivas o restante das amostras (20) obtiveram resultado negativo para fungos. **Conclusão:** Conclui-se que 60% resultados deram positivos para *Cândida albicans*, obteve-se um percentual significativo elevado, mesmo pelo fato de se tratar de gestantes as mesmas já se encontravam em acompanhamento de pré-natal. Conclui-se também que a prevalência de gestantes diagnosticada com candidíase se encontrava no segundo trimestre da gestação.

Palavras-chave: Cândida, Gestantes, Diagnóstico, Fungos, Candidíase.