



PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR NA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI, CEARÁ: ESTUDO DESCRITIVO TRANSVERSAL (2020-2023)

ALÍCIA EMILY MACIEL NASCIMENTO; CÍCERA LARYSSA LIMA NASCIMENTO; ;
DÉBORAH ALBUQUERQUE ALVES MOREIRA

Introdução: A Leishmaniose Tegumentar (LT) é uma doença transmitida pela picada da fêmea do mosquito-palha infectada por protozoários do gênero *Leishmania*. No Ceará, o número de casos tem variado ao longo dos anos, com 11.845 notificações entre 2007 e 2024. A LT afeta a pele e as mucosas, gerando lesões que variam de pequenas feridas a grandes úlceras. O diagnóstico é feito por exames parasitológicos ou análise de amostras das lesões. **Objetivo:** Descrever o perfil epidemiológico dos casos de LT na Região Metropolitana do Cariri, Ceará, entre 2020 e 2023, analisando a distribuição temporal e espacial, além de identificar fatores associados à disseminação. **Métodos:** Estudo descritivo transversal, com abordagem quantitativa, baseado em dados epidemiológicos. Foram coletadas informações das notificações de LT nos municípios de Juazeiro do Norte, Barbalha e Crato, de 2020 a 2023, a partir dos boletins epidemiológicos da Secretaria de Saúde do Ceará (SESA). A evolução dos casos foi analisada para detectar padrões de crescimento e estabelecer o canal epidêmico, avaliando a significância do aumento observado. **Resultados:** Entre 2020 e 2023, foram notificados 371 casos de LT na Região Metropolitana do Cariri, distribuídos em: 164 em Juazeiro do Norte, 91 em Barbalha e 116 em Crato. A maior parte dos casos ocorreu em homens (53,6%), enquanto as mulheres representaram 46,4%. Houve um aumento progressivo no número de casos ao longo do período, ultrapassando o limiar epidêmico. A região apresenta fatores ambientais favoráveis à proliferação do vetor, como mananciais hídricos e condições climáticas propícias. **Conclusão:** A Região Metropolitana do Cariri apresentou um aumento significativo de casos de LT entre 2020 e 2023, ultrapassando o limiar epidêmico. No entanto, embora fatores ambientais sejam mencionados, a correlação direta com o aumento de casos precisa ser investigada. Recomenda-se a implementação de medidas de controle do vetor e ações educativas para a população a fim de mitigar a disseminação da doença.

Palavras-chave: LEISHMANIOSE; EPIDEMIOLOGIA; VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA; ZOONOSE; PROTOZOÁRIO