



ASPECTOS HISTOPATOLÓGICOS SUBSIDIÁRIOS PARA O DIAGNÓSTICO DO LÍQUEN PLANO ORAL: REVISÃO DE LITERATURA

RAYANE ARAÚJO MARQUES SILVA LIMA; EMÍLIO PIRES DINIZ NETO; LUCCA GUERREIRO CARVALHO PINHEIRO; ISADORA TEMÓTEO CARNEIRO COSTA; LUCAS LEANDRO MEDEIROS

INTRODUÇÃO: O líquen plano (LP) é uma doença inflamatória crônica de causa indeterminada que afeta a pele e as membranas mucosas. O LP pode provocar lesões na pele (líquen plano cutâneo), genitália (líquen plano peniano ou vulvar), couro cabeludo (líquen plano pilar), unhas, esôfago) e cavidade oral (líquen plano oral). Este último é um subtipo que acomete a mucosa e que ocorre mais comumente em adultos de meia-idade. Além disso, ele pode ocorrer sozinho ou em conjunto com outras das múltiplas formas supracitadas. **OBJETIVO:** Investigar os achados histopatológicos subsidiários para o diagnóstico do LP oral. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão de literatura, com respaldo em artigos encontrados nas bases de dados UpToDate e *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE/PubMed). **RESULTADOS:** Os achados histológicos comuns de LP oral incluem: paraqueratose e leve acantose do epitélio, projeções do epitélio em forma de dentes de serra, corpos de Civatte, coloides, hialinos ou citoides (degeneração de liquefação da camada basal com queratinócitos apoptóticos), uma banda amorfa de material eosinofílico na membrana basal e um infiltrado linfo-histiocitário misto liquenoide em forma de faixa na submucosa. **CONCLUSÃO:** O exame de biópsia elucida os aspectos microscópicos da patologia. Entretanto, os achados histológicos do LP oral não são patognomônicos, e, portanto, para o diagnóstico da doença, tornam-se essenciais a revisão da história do paciente e o exame físico. Ademais, nos casos em que os achados clínicos e histológicos são inconclusivos, a microscopia de imunofluorescência direta (IFD) da mucosa perilesional é utilizada para excluir distúrbios vesiculobolhosos autoimunes como pênfigo, penfigoide e dermatose bolhosa por IgA linear. Nesse sentido, no LP oral, a IFD geralmente demonstra depósitos globulares de IgM na submucosa. Destarte, o exame de biópsia e seus achados são insuficientes para a confirmação diagnóstica, que ocorre através da exclusão de outras patologias.

Palavras-chave: Líquen plano, Histopatologia, Diagnóstico, Biópsia, Dermatopatologia.