



PESQUISAS SOBRE A PRESENÇA DE CARRAPATOS EM TAMANDUÁ-BANDEIRA (MYRMECOPHAGA TRIDACTYLA)

HÉLDER SILVA E LUNA; FERNANDO CARLOS MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR; LARA YASSUKO NAKAMURA; JÚLIA VITÓRIA RISCALLI MOTA GIMENEZ; GEOVANA PEREIRA DE CARVALHO

INTRODUÇÃO: O tamanduá-bandeira (*Myrmecophaga tridactyla*) possui ampla distribuição geográfica e é uma importante espécie presente no cerrado. Entretanto, estão classificados como vulneráveis merecendo grande atenção por pesquisadores da mastofauna na área de conservação. Entre os fatores de redução populacional pode-se citar: atropelamentos, destruição de habitat, incêndios e a caça. Dentre as diferentes pesquisas com este animal, a análise dos ectoparasitas têm sido realizada e apresentam grande importância, em especial nas questões ligadas a saúde animal e também humana uma vez apresentarem riscos de doenças zoonóticas. **OBJETIVOS:** O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão bibliográfica dos trabalhos relacionados a registros de carrapatos na espécie *Myrmecophaga tridactyla*. **METODOLOGIA:** Foi realizado uma revisão bibliográfica no período de fevereiro a março de 2023 na National Library of Medicine National Institute of Health (PubMed) utilizando como descritores: “*Myrmecophaga tridactyla*” “Parasitism” “Ticks”. Os critérios de inclusão foram trabalhos na área da medicina veterinária e ciências biológicas relativos à registros de carrapatos na espécie *Myrmecophaga tridactyla*. Os critérios de exclusão foram artigos não relacionados ao tema proposto. **RESULTADOS:** Dentro destes critérios adotados foram selecionados sete trabalhos relacionados a presença de carrapatos no tamanduá-bandeira. Após leitura dos artigos foi possível compilar o registro das seguintes espécies de carrapatos em *Myrmecophaga tridactyla*: *Amblyomma cajennense*, *Amblyomma nodosum*, *Amblyomma auricularium*, *Amblyomma calcaratum*, *Amblyomma ovale*, *Amblyomma triste*, *Amblyomma parvum*, *Amblyomma sculptum*, *Amblyomma dubidatum*, *Amblyomma pseudoconcolor*, *Amblyomma scalpturatum*, *Amblyomma pictum*, *Amblyomma brasiliense*, *Amblyomma neumanni*, *Amblyomma oblongoguttatum*, *Amblyomma tapirellum*, *Amblyomma tonelliae*, *Rhipicephalus microplus* e *Rhipicephalus sanguineus*. Estes registros indicam uma ampla variedade de espécies de carrapatos parasitando o tamanduá-bandeira. **CONCLUSÃO:** O desenvolvimento de trabalhos científicos com mamíferos, em especial da nossa fauna, são de extrema importância, os quais proporcionarão apoio aos profissionais responsáveis pela saúde dos animais seja em cativeiro ou de vida livre assim como verificar as possibilidades de identificação de carrapatos que possam ser potenciais portadores de patógenos que apresentem importância para a saúde pública.

Palavras-chave: Ectoparasitas, Mastofauna, Medicina veterinária, Parasitologia, Saúde pública.