



GLOMERULOPATIA POR HIV COMO PREDITIVO PARA O DESENVOLVIMENTO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA

MILTON CEZAR COMPAGNON; KARLA MARLY SOARES MARTINS; KARLA MARLY SOARES MARTINS

INTRODUÇÃO: Há uma variedade de glomerulopatias associadas a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), incluindo a nefropatia por IgA, glomerulonefrite membranoproliferativa e nefropatia membranosa. O desenvolvimento de imunocomplexos tem relação direta com o nível de agressão do HIV que infecta as células tubulares renais, levando a dilatação microcística e rápida perda da função renal em muitos casos. **OBJETIVOS:** Avaliar a relação da glomerulopatia por HIV como determinante para o desenvolvimento de Doença Renal Crônica (DRC). **METODOLOGIA:** Estudo descritivo e de natureza quantitativa, desenvolvido em pacientes que desenvolveram doença renal crônica após a infecção pelo HIV. Os dados foram coletados no ambulatório de nefrologia de um hospital universitário da Cidade de Recife-PE, atendendo a Resolução 466/2012. **RESULTADOS:** Houve prevalência do número de homens (10) em relação ao de mulheres (05), ambos acima de 35 anos de idade. Na maioria dos pacientes (66%), o diagnóstico do HIV ocorreu a mais de 10 anos, bem como o início da terapia antirretroviral. Um número expressivo (86,7%) dos participantes do estudo tiveram a doença renal crônica (DRC) diagnosticada em um período próximo ou superior a 5 anos da confirmação da sorologia para HIV. O que pode ser uma evidência da infecção pelo HIV ter desencadeado lesões renais que levaram ao surgimento da DRC após um período de 5 anos em média. **CONCLUSÃO:** As evidências encontradas neste estudo sugerem que a infecção pelo HIV predispõe ao surgimento de glomerulopatia, desencadeando a DRC. Pois o início da diálise ocorreu no mesmo período após o início da terapia antirretroviral.

Palavras-chave: Glomerulopatia por hiv, Doença renal crônica, Infecção por hiv, Nefropatia por hiv, Vírus da imunodeficiência humana.