



INFECÇÕES POR TRICOMONAS VAGINALIS EM GESTANTES ASSISTIDAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM MUNICÍPIO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-PE

STHEFANY VITÓRIA DE OLIVEIRA; ANA VIRGÍNIA MATOS SÁ BARRETO

INTRODUÇÃO: A tricomoníase é a Infecções Sexualmente Transmissível (IST) não viral mais prevalente no mundo, causada pelo protozoário *Trichomonas vaginalis*, em mulheres, a infecção pode causar leucorreia, prurido, disúria, polaciúria, hiperemia vaginal e odor. O *T. vaginalis* pode se instalar na vagina, uretra e endocérvice, e desencadear patologias que variam entre o câncer, infertilidade e complicações gestacionais. Durante a gestação, o protozoário pode causar desfechos obstétricos insatisfatórios através da transmissão vertical, evidenciados por abortamento, prematuridade, baixo peso do recém-nascido e ruptura prematura de membranas. **OBJETIVO:** Avaliar a prevalência de casos de tricomoníase em gestantes acompanhadas na Atenção Primária à Saúde em município da Região Metropolitana do Recife-PE. **METODOLOGIA:** Realizado levantamento de prontuários e avaliação de dados secundários de 533 gestantes assistidas em três Unidades Básicas de Saúde e que realizaram o pré-natal entre os anos de 2017 a 2022. Foram incluídas gestantes que relataram sinais e sintomas, diagnóstico etiológico ou tratamento para tricomoníase, considerando o perfil epidemiológico quanto a idade, escolaridade e o estado civil. **RESULTADOS:** a pesquisa evidenciou a presença de *T. vaginalis* em 28 (22,7%) dos prontuários de gestantes analisados e em 22 (17,9%) não apresentavam o agente etiológico, mas a descrição dos sintomas poderia definir a infecção por critério clínico. A infecção esteve mais presente em gestantes com idade entre 21 e 30 anos, com nível de escolaridade acima de oito anos e que se declaravam solteiras. Não houve associação entre a infecção com complicações gestacionais. **CONCLUSÃO:** A tricomoníase foi a segunda causa mais identificada durante a gestação. Acima desse quantitativo por sua vez, encontram-se os casos por Candidíase vulvovaginal. É necessário a atenção do profissional com as gestantes durante consultas de pré-natal, mediante o rastreio ginecológico a fim de prevenir complicações perinatais, em advento ao considerável número de gestantes assintomáticas evidenciados nas literaturas.

Palavras-chave: Tricomoníase;, Gestação;, Cuidado pré-natal;, Prevalência;, Complicações..