



ANALISE DOS ASPECTOS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL NO MUNICÍPIO NO CENTRO SUL DA BAHIA

GABRIELLE NOGUEIRA LUCIANO; VANESSA CRISTINA TEIXEIRA; MARIA FERNANDA FERNANDES TEIXEIRA; HERNAN CARLOS SAMPAIO FILHO; BRUNO NETO MARTINS AGUIAR

Introdução: A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença grave, causada pelo protozoário *Leishmania*, transmitida aos seres humanos pela picada do mosquito flebotômico. A região centro-sul da Bahia é endêmica para essa doença, sendo importante entender sua epidemiologia local. **Objetivo:** Avaliar a epidemiologia dos casos confirmados de LV no município de Guanambi, Bahia, no período de 2014 a 2023, além de analisar as características epidemiológicas dos casos de óbito, comparando com as características dos grupos de cura e descrever as características do grupo com coinfeção HIV-LV. **Metodologia:** Foram analisadas as fichas de notificação epidemiológica dos casos confirmados de LV no município de Guanambi, fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde, no período de 2018 a 2023. Os pacientes foram organizados em três grupos: geral (42 casos), cura (32 casos) e óbito (10 casos), para análise. Os dados foram tabulados em uma planilha Excel e foram realizados cálculos de frequência simples, taxa de incidência, letalidade e mortalidade. **Resultados:** Dos 42 casos registrados, 76,2% foram em pacientes do sexo masculino. A média de idade foi de 40,3 anos. A faixa etária mais afetada foi a de 40 a 49 anos. Dos pacientes, 79% se curaram, enquanto 21% faleceram. A taxa de letalidade foi de 21,4%, sendo maior na faixa etária de 70 a 79 anos. Os sintomas mais frequentes foram febre, palidez, fraqueza e emagrecimento. O grupo de óbito apresentou uma frequência maior de sintomas em relação ao grupo de cura com a presença da febre em 100% dos casos e palidez em 78%, além de uma média de idade mais alta, de 61 anos. A taxa de coinfeção HIV-LV foi de 16,7%, com uma letalidade de 14,2% nesse grupo. **Conclusão:** A LV é uma doença grave em Guanambi, apresentando taxa de letalidade significativa. Diante disso, ações de saúde pública devem focar em políticas de diagnóstico precoce, treinamento da equipe de saúde para melhorar a assistência e controle do reservatório, o cão doméstico, visando reduzir a morbidade e mortalidade por essa doença tão persistente na região.

Palavras-chave: Leishmaniose, Leishmaniose visceral, Taxa de letalidade, Faixa etária, Coinfeção.