



ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DA ADEÇÃO ÀS MEDIDAS DE CONTROLE DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 EM UMA UNIVERSIDADE DA BAIXADA FLUMINENSE

DANIEL ANTUNES PEREIRA; SOLANGE DA SILVA MALFACINI; LUIZ FILIPE DA SILVA MALFACINI; PHAMELA DE FREITAS GERALDO ANTUNES; MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES ENES

Introdução: A pandemia de Covid-19 exigiu intervenções significativas em nível global para conter a propagação da doença. Medidas como uso de máscaras e distanciamento/isolamento social foram adotadas para conter a disseminação do vírus zoonótico. O Programa de Imunização iniciou em 2021 com a utilização de vacinas de diferentes laboratórios e tecnologias, como Oxford/Astrazeneca composta por um vetor viral de adenovírus, Pfizer produzida através de RNA mensageiro (mRNA) e outras. **Objetivos:** Conhecer o estado vacinal dos alunos em diferentes cursos de uma universidade da baixada fluminense e analisar a adesão às medidas de controle da doença na amostra estudada. **Metodologia:** Trata-se de parte dos resultados de um estudo de coorte retrospectivo onde se avaliou o risco da doença no período agosto/2020 a dezembro/2021, sendo Grupo exposição: alunos do 1º ao 9º período do curso de Medicina da Universidade X e grupo controle: alunos do 1º ao 7º período do curso de Direito na Universidade X no período estudado. Coleta de dados por questionário online, conforme aprovação pelo CEP. Tabulação em software Microsoft Excel, com análise de frequências relativas e tendência central. **Resultados:** Amostra composta por 467 indivíduos, sendo 255(54,6%) acometidos, destes, 146(49,6%) do curso de direito e 109(63%) do curso de medicina. Houve uma proporção de 99,64% de vacinados no curso de direito e 96,54% no curso de medicina. A proporção de indivíduos com a 3ª dose foi de 52,48% e 61,85% em direito e medicina respectivamente. Em ambos a vacina que mais foi utilizada foi a Pfizer, seguida da AstraZeneca em todas as doses. Quanto ao uso de máscaras, a adesão foi de 65% no grupo controle e 92% no grupo exposição. **Conclusão:** Os resultados mostram maior adesão ao uso de máscara entre alunos de medicina, provavelmente por serem mais expostos à doença; diminuição considerável de adesão à vacinação a partir da 3ª dose em ambos os cursos, sendo mais expressiva para o curso de Direito. Além disso, no curso de Direito o grupo demonstrou descrédito quanto ao efeito protetor do uso de máscaras na disseminação do coronavírus.

Palavras-chave: Covid-19, Vacinação, Universidade, Epidemiologia, Prevenção.