



ENDOMETRIOSE: IMPORTÂNCIA DA SUSPEITA ATRAVÉS DA CLÍNICA

MATHEUS GIRALDELLI SANTOS; LARISSA METELLO DA COSTA LIMA

Introdução: A endometriose consiste em uma doença crônica, na qual células do endométrio, principalmente glândulas e estroma, são capazes de se translocar da região uterina, se disseminar através do peritônio se instalando em diferentes sítios extraovarianos, causando, por vezes, dor de intensidades variadas nas mulheres acometidas. Ainda com mecanismos fisiopatológicos não totalmente esclarecidos, seu diagnóstico é bastante difícil, pois em muitos casos a doença é assintomática e exames de imagem e laboratoriais possuem baixa capacidade de diagnosticá-la, sendo necessário a avaliação por laparoscopia, com ou sem biopsia. **Objetivo:** Mostrar por meio de uma revisão literária a importância da suspeita e investigação sintomatológica de pacientes portadoras de endometriose que ainda não possuem o diagnóstico. **Materiais e métodos:** O estudo se trata de uma revisão descritiva integrativa de literatura, realizadas a partir do levantamento de dados de fontes secundárias a partir de 2020, em português e inglês, por meio do Google Acadêmico, Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e da Biblioteca Virtual em Saúde - BVS (com Medline e Lilacs), utilizando os descritores “endometriose” e “diagnóstico”. A elaboração do resumo simples foi dividida em cinco etapas: elaboração dos objetivos; seleção das referências bibliográficas utilizadas; coleta de dados; análise crítica dos estudos; discussão e apresentação da revisão. **Resultados:** O reconhecimento das queixas da mulher com endometriose consiste no pilar principal para a investigação dessa doença, uma vez que seu diagnóstico é bastante complexo. A infertilidade, associada às manifestações clínicas de dor intensa e o treinamento médico especializado capaz de reconhecer a patologia, se mostraram os facilitadores mais eficientes para findar o diagnóstico, que se dá através de laparoscopia evidenciando fragmentos de tecido endometrial na cavidade peritoneal. **Conclusão:** É imperativo que o profissional especialista sempre suspeite de endometriose em pacientes com manifestações clínicas de dor pélvica, dismenorreia, dispareunia e infertilidade, e inicie a investigação dessa doença, uma vez que consiste em um diagnóstico demorado, gerando sofrimento crônico, tanto físico, quanto psicológico e social às pacientes portadoras.

Palavras-chave: Endometriose, Infertilidade, Dor pélvica, Laparoscopia, Diagnóstico.