

OTITE CRÔNICA EM FELINO ASSOCIADO A CARCINOMA CERUMINOS - RELATO DE CASO

JANAINA PEIXOTO FERREIRA BATISTA; HENRIQUE CARLOS ABREU DE PAULA; GABRIEL OLIVEIRA DE ALMEIDA; JÚLIO APARECIDO DASMACENO JÚNIOR; LUCAS QUEIROGA DE OLIVEIRA

Introdução: A otite é uma afecção corriqueira na clínica de pequenos animais e pode ser definida como externa, média e interna. A otite externa ocorre quando há inflamação do canal auditivo que inclui as estruturas anatômicas do pavilhão auricular e membrana timpânica. O tratamento cirúrgico torna-se uma opção quando não há mais como realizar o tratamento clínico. Objetivos: O estudo teve por objetivo relatar um caso de otite crônica e carcinoma ceruminoso, em um felino. Relato de caso: Foi admitido no Hospital Veterinário São Lucas - Afya de Ji-Paraná, um felino, macho, inteiro, da raça Persa, com histórico de otite crônica. Os sinais clínicos descritos foram de prurido, exsudato purulento e odor fétido, ao exame físico foi observado a presença de uma massa nodular proveniente do conduto auditivo até a orelha externa, estenosando o conduto. Diante do histórico e quadro clínico do paciente optou-se pelo tratamento cirúrgico com a técnica de ablação total do conduto auditivo e conchectomia total. As amostras excisadas foram encaminhadas para o setor de histopatologia para exame de biópsia. Discussão: A cirurgia procedeu sem intercorrências, após 24 horas do procedimento o paciente foi liberado para tratamento domiciliar, retornando com 14 dias para remoção dos pontos cirúrgicos sem complicações. O exame histopatológico que teve como resultado carcinoma de glândulas ceruminosas. A otite é uma afecção corriqueira na clínica médica de pequenos animais. O diagnóstico precoce e o tratamento correto são de suma importância para prevenir essa injúria, que quando não tratada de forma efetiva, poderá evoluir e agravar o quadro clínico do animal. Conclusão: O tratamento por ablação total do conduto auditivo associado a conchectomia terapêutica se mostrou eficiente para a afecção do caso. O paciente não apresentou sinal de intercorrência e recidiva, o que reforça o sucesso do procedimento cirúrgico e das margens para remoção da neoplasia diagnosticada como carcinoma de glândulas ceruminosas.

Palavras-chave: Conchectomia, Cirurgia, Histopatologia, Neoplasia,.