



## HÉRNIA INGUINAL COM ENCARCERAMENTO EM CANINO FILHOTE - RELATO DE CASO

HALANA MEIRINHOS PESSOA; RUMMENIGGUE JOSÉ DE OLIVEIRA NASCIMENTO;  
MIGUEL PIETRO DOS SANTOS SANTIAGO; PAULO CÉSAR NASCIMENTO DOS SANTOS;  
ROBERTA CHAGAS DE ALBUQUERQUE

**INTRODUÇÃO:** As hérnias são distensões de conteúdo abdominal que projetam-se além da cavidade ou estrutura que a contém. São caracterizadas verdadeiras pela formação de um anel herniário, saco herniário e conteúdo. Até o sexto mês de idade acontece o fechamento espontâneo deste anel, portanto não indica-se realização cirúrgica, contudo, quando não há a possibilidade de realocação das vísceras, indica-se a realização do procedimento cirúrgico devido ao risco de estrangulamento da estrutura que o compõe e deslocamento para a região escrotal. **OBJETIVOS:** Relatar um caso clínico-cirúrgico de um cão da raça Pinscher, filhote, de cinco meses de idade submetido à herniorrafia inguinal associado ao procedimento de orquiectomia pela mesma região. **RELATO DE CASO:** Atendeu-se um cão jovem, ainda com testículos em cavidade abdominal, apresentando aumento de volume em região inguinal direita irreduzível manualmente. Realizou-se exame de ultrassonografia abdominal e constatou a herniação em região inguinal com encarceramento de alça intestinal. Foi submetido a herniorrafia inguinal juntamente com a orquiectomia bilateral para reduzir a possibilidade de recidivas. A incisão foi realizada acima do anel inguinal paralelo ao flanco. Exposto o saco herniário foi realizada a remoção testicular e ligadura do cordão espermático. Após reduzido o conteúdo abdominal, realizou-se sutura contínua no saco herniário e suturas descontínuas no anel herniário com fio de náilon 2-0. **DISCUSSÃO:** Foi necessária a realização da herniorrafia inguinal bem como orquiectomia precoce, para realização da correção do encarceramento, com o objetivo de prevenção de isquemia por estrangulamento da região intestinal herniada, chances de deslocamento para a região escrotal e consequentemente futuras neoplasias testiculares. **CONCLUSÃO:** O animal obteve uma boa recuperação, não houveram recidivas e manteve os parâmetros de defecação normais.

**Palavras-chave:** Hérnia, Encarcerada, Filhote, Herniorrafia, Orquiectomia precoce.