

HEMANGIOSSARCOMA PROSTÁTICO CANINO: RELATO DE CASO

REBECKA CARVALHO DE SOUZA SILVA; ALANA DE OLIVEIRA CAMPELLO

Introdução: Hemangiossarcomas (HSA) são tumores de alta malignidade que têm sua origem nas células do endotélio vascular. Por se tratar de uma neoplasia originada no endotélio vascular, o HSA pode ocorrer em qualquer ponto vascularizado do corpo do animal. Geralmente, acomete cães com idades entre 8 e 13 anos, podendo acometer cães mais jovens, com menor casuística. **Objetivo:** O presente trabalho relata o caso de um canino, macho, castrado, da raça Bulldog Francês de 12 anos, que foi acometido por um hemangioma prostático com metástase em linfonodo inguinal. **Relato de caso/experiência:** O paciente deu entrada para atendimento veterinário com queixa de tenesmo, êmese, hiporexia e emagrecimento progressivo. Ao exame clínico, o paciente apresentava perda evidente de massa muscular, mucosas levemente hipocoradas, sopro cardíaco leve, letargia e moderado desconforto à palpação abdominal. Foram realizados exames laboratoriais hematológicos e painel bioquímico completo, Raio-x (RX) de tórax e ultrassonografia abdominal. Os exames laboratoriais evidenciaram anemia normocítica normocrômica. A ultrassonografia abdominal revelou próstata com dimensões acentuadamente aumentadas, contornos irregulares, de aspecto heterogêneo com áreas hiperecogênicas/hipoecogênicas e outras cavitárias entremeadas, sugestivo de neoplasia, demais órgãos sem alteração digna de nota. O RX de tórax evidenciou cardiomegalia, padrão bronquial caudodorsal, sem sinais sugestivos de metástase pulmonar. O paciente foi submetido a uma laparotomia exploratória para realização de prostatectomia total e avaliação de cavidade abdominal. Durante o transoperatório, foi possível observar presença de pequenas nodulações de aparência hemorrágica em omento maior próximo ao baço, optou-se por realizar esplenectomia. Foram encaminhadas amostras da próstata, baço, omento maior e linfonodo inguinal para exame histopatológico, que revelou tratar-se de um hemangiossarcoma prostático com metástase em linfonodo, amostras de baço não apresentaram alterações neoplásicas. O tratamento quimioterápico adjuvante foi ofertado ao tutor, porém, foi recusado. O paciente teve sobrevida de 2 meses após a ressecção cirúrgica, sem autorização para realização de necropsia. **Conclusão:** O HSA é uma neoplasia agressiva, com alto potencial metastático, que acomete principalmente baço, pele, coração e rins, mas também pode acometer órgãos como a próstata e deve ser considerada com diagnóstico diferencial para neoplasia neste órgão.

Palavras-chave: Hemangiossarcoma, Neoplasia, Oncologia, Próstata, Pequenos animais.