



CÓLICA EQUINA: UMA REVISÃO SOBRE OS FATORES QUE INFLUENCIAM A SÍNDROME

JOEL DE LIMA OLIVEIRA; IZADORA PINHEIRO LANDIM; LUCAS RAVEL DA SILVA CORDEIRO; VITÓRIA FIGUEIREDO LIMA

Introdução: A cólica equina é uma síndrome que pode ser classificada de acordo com a etiologia, sendo esta por compactação ou torção de alça intestinal. É relevante conhecer e discutir sobre os principais fatores que influenciam essa condição, sendo relevante tanto para conduta clínica, quanto para o valor zootécnico do animal. **Objetivo:** Objetivou-se demonstrar os principais fatores que influenciam a condição clínica da cólica equina. **Materiais e Métodos:** Foram realizadas pesquisas em artigos de revistas da plataforma *Scielo* Brasil, analisou 10 artigos dos quais elegeu 4 trabalhos com *Qualis* A1 a A4 dos anos de 2002, 2020 e 2023 com maior relevância sobre a temática, foram confrontadas as principais causas de cólica dos resultados de cada artigo, levando em consideração: área geográfica e ambiente em que vive o cavalo, dieta do animal e tipo de atividade exercida pelos animais. Em seguida, parte-se para discussão dos resultados e conclusão da pesquisa. **Resultados:** Os estudos relataram localizações geográficas distintas, sendo dois relatos da região sudeste e um do sul do Brasil, apenas um dos artigos foi executado nos EUA, evidencia então, que a condição do distúrbio de cólica em equinos torna-se relevante para o Brasil, além disso, constata-se em uma das literatura que apesar de uma dieta equilibrada o quadro de cólica pode advir de raças predisponentes como a Quarto de milha, além da dieta, a literatura relata que a qualidade da água, infestações de parasitas gastrointestinais, excesso de fibras e estresse são um dos principais fatores que condicionam a síndrome cólica. Os animais de esporte como hipismo e corrida são os mais afetados pela condição. Ainda se relata que as cólicas por compactação são as de maiores casuísticas, sendo assim, quanto mais rápida a percepção dos sinais clínicos, mais facilmente é possível a reversão dessa afecção. **Conclusão:** Os principais fatores da cólica equina são dieta inadequada e esforço físico excessivo. A detecção precoce dos sinais de cólica e a busca imediata de atendimento veterinário são essenciais para maximizar as chances de recuperação do cavalo de maneira rápida e eficaz.

Palavras-chave: Equídeos, Gastrointestinais, Dieta, Recuperação, Parasitas.