



HIDRONEFROSE SECUNDÁRIA À LIGADURA DE URETER COM LACRE EM CADELA: RELATO DE CASO

YUAN GOES RIBEIRO CAMPOS; MURILO HENRIQUE DIAS DA SILVA; MAÍRA FERREIRA FRANÇA MARTINS; RAFAELA OLIVEIRA CUNHA; ELÓI DOS SANTOS PORTUGAL

Introdução: A ovariectomia é uma das cirurgias mais realizadas na Medicina Veterinária, visando limitar o controle reprodutivo e prevenir o estro em fêmeas. Contudo, ela não está isenta de erros técnicos graves, sendo um deles a ligadura inadvertida do ureter durante a ligadura do pedículo ovariano e corpo uterino. **Objetivos:** Relatar o caso de uma cadela que foi submetida à ureteronefrectomia para tratamento de hidronefrose secundária à ligadura inadvertida do ureter com lacre. **Relato de Caso:** Foi atendido no Hospital Veterinário do IFSULDEMINAS um canino, fêmea, raça Dachshund, 15 anos e 5,8 kg, que apresentava nódulo cutâneo próximo à região mamária e histórico de castração há 10 anos devido a piometra. Sendo assim, procedeu-se com protocolo de estadiamento tumoral da paciente, para posterior procedimento cirúrgico. No entanto, na ultrassonografia abdominal identificou-se obstrução ureteral distal e hidronefrose em rim direito, compatível com ureterolitíase. Assim, priorizou-se a realização de ureteronefrectomia direita para resolução do quadro. Durante o procedimento cirúrgico, visualizou-se a presença de um lacre próximo ao ureter direito, contudo, não foi observado envolvimento do ureter nesse nível. Entretanto, distalmente, rente a entrada do ureter na bexiga, observou-se a presença de outro lacre envolvendo o ureter e gerando obstrução ureteral. Deste modo, procedeu-se com nefrectomia padrão e remoção dos lacres. Após 14 dias, a paciente apresentou completa recuperação do procedimento cirúrgico. **Discussão:** A hidronefrose unilateral é causada pela obstrução ureteral em qualquer ponto de seu comprimento ou em sua entrada na bexiga. Conforme ocorrido no caso, os pacientes acometidos podem permanecer assintomáticos por longos períodos devido à função compensatória do rim contralateral, sendo a hidronefrose apenas um achado no exame ultrassonográfico. **Conclusão:** Conclui-se que a ligadura inadvertida do ureter é um erro técnico grave nos procedimentos de ovariectomia que pode levar à perda completa do rim. Vale salientar que o uso de lacres é contraindicado nesses procedimentos, uma vez que podem predispor à formação de fístulas e granulomas como complicações a longo prazo. Ademais, ressalta-se a importância da realização do estadiamento tumoral nesses pacientes, pois além auxiliar na pesquisa de metástases, permite a investigação de possíveis comorbidades que os pacientes possam apresentar.

Palavras-chave: Abraçadeira, Canina, Obstrução ureteral, Ovariectomia, Ureteronefrectomia.