



RELATO DE CASO DE EPULIDE FIBROMATOSO EM CÃO

JENNYFFER TAKASE MONTEIRO; THAINÁ MONTEIRO MARQUES OLIVEIRA;
MARCELLA KATHERYNE MARQUES BERNAL; ADRIANA MACIEL DE CASTRO
CARDOSO JAQUES; SAMARA DE CASTRO LOURA

Introdução: Plídes são patologias classificadas como neoplasias benignas que se localizam na gengiva, especificamente nos ligamentos periodontais sendo comum em cães e com predisposição nas raças Boxer e Buldogue. Essas neoplasias podem ser classificadas em ossificantes, acantomatosas e fibromatosa, sendo essa última a mais frequente. A patologia do tipo fibromatosa é caracterizada como uma massa que, com o passar do tempo, pode ultrapassar o dente e prejudicar na mastigação do animal; Possui como sinais clínicos mais comuns aumento de volume na gengiva, dificuldade de mastigar, sialorreia e halitose. Ademais, o diagnóstico é feito através do exame histopatológico o qual revela o epúlíde como uma estrutura densa, com estroma vascularizado e não encapsulado. **Objetivos:** O presente trabalho consiste em apresentar um relato de caso sobre epúlíde do tipo fibromatosa. **Relato de Caso:** Foi feita a biópsia de três fragmentos oriundos do tecido da cavidade oral de um cachorro, SRD, com quatro anos de idade. As amostras foram coletadas no Hospital Veterinário Mário Dias Teixeira localizado na Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) e foram analisadas no Laboratório de Patologia do campus. Após a análise da amostra, foi possível observar que dois destes fragmentos apresentaram coloração branca com áreas acastanhadas, medindo, o maior 0,8 x 0 cm e o menor 0,7 x 0,2 cm. O terceiro fragmento mediu 0,6 x 0,3 cm, apresentando coloração enegrecida marginalmente e coloração branca na região central, enquanto no histopatológico observou-se o revestimento epitelial estratificado com áreas de ulceração, e o epitélio em alguns locais apresentava pontes que se projetam para o tecido conjuntivo, que constitui o elemento predominante do neoplasma e que apresenta áreas de infiltração linfocitária. **Discussão:** O neoplasma encontrado evidencia o epúlíde fibromatoso, haja vista que há presença de ulceração do epitélio da superfície provocado pelo crescimento tecidual acelerado, gerando a infiltração de células plasmáticas e linfocitárias. **Conclusão:** Portanto, esses achados reforçam a relevância da biópsia e análise histopatológica na identificação e no tratamento de neoplasias orais em animais domésticos.

Palavras-chave: Neoplasia benigna, Histopatologia, Canídeo, Halitose, Gengiva.