



PREVALÊNCIA DE LESÕES ORAIS E POTENCIALMENTE MALIGNAS EM PESCADORES NA LAGOA DE ARARUAMA NO RIO DE JANEIRO

SANDEMBERG FRANÇA DO AMARAL; LUCIANE ZANIN

INTRODUÇÃO: A pesquisa buscou realizar um levantamento epidemiológico dos casos de DPMs em pescadores do litoral da Lagoa de Araruama no Estado do Rio de Janeiro. **OBJETIVO:** Levantar a prevalência de alterações potencialmente malignas em pescadores e estudar a sua relação com outros possíveis fatores etiológicos. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Foram convidados a participar do estudo 120 pescadores de ambos os sexos, maiores de 18 anos. EXCLUÍDOS OS QUE RECUSARAM REALIZAR O EXAME INTRAORAL. Os voluntários responderam um questionário sociodemográfico e saúde. Avaliados clinicamente em cadeiras convencionais, com boa fonte de iluminação, com auxílio de espátulas de madeira, gases para afastar as estruturas anatômicas. Entrevistados e examinados 65 pescadores todos participantes voluntários da amostra. Em busca de lesões fundamentais como manchas, placas, úlceras, crostas, bolhas e qualquer outra queixa ou alteração observada. Participaram de palestras educativas acerca do tema abordando definição, desenvolvimento, fatores etiológicos, aspectos preventivos da doença, importância da visita periódica ao cirurgião-dentista. **RESULTADOS:** A prevalência de desordens orais entre os pescadores que utilizam medicamentos de rotina é de 28,0% e entre aqueles que não utilizam a prevalência é de 12,5%. A prevalência entre os pescadores com casos de câncer na família é de 26,7%, já entre os demais é de 11,4%. A prevalência entre os fumantes é de 30,0% e entre os não fumantes é de 11,1%. A prevalência entre os que fazem uso de bebidas alcoólicas é de 18,9% e entre os que não fazem é de 11,1%. A prevalência entre os usuários de drogas ilícitas é de 33,3% e entre os não usuários observa-se prevalência de 14,8%. Todos os pescadores com presença de desordens orais potencialmente malignas apresentam higiene bucal regular. **CONCLUSÃO:** Nos resultados apresentaram pouca informação sobre sintomatologia do câncer de boca e mais sobre sua prevenção; Os mais atingidos foram do gênero masculino, de pele clara, faixa etária acima dos 50 anos, tabagistas e etilistas; A localização anatômica mais frequente foi a boca, seguida pelo lábio; Existe pescadores com lesões precursoras em estágios iniciais; provavelmente porque as lesões iniciais são assintomáticas e também, pelas inúmeras dificuldades de natureza social e desconhecimento.

Palavras-chave: **HÁBITOS; LESÃO BUCAL; PESCADORES; PREVALÊNCIA; QUEIXA**