



LEVANTAMENTO DE CASUÍSTICA DE PODODERMATITE EM BOVINOS LEITEIROS CRIADOS NA REGIÃO NORTE

VITOR HUGO RODRIGUES DA SILVA; LÍVIA BATISTA CAMPOS; MATEUS DE ANDRADE DA SILVA

INTRODUÇÃO: Pododermatite é uma doença infecciosa caracterizada pela inflamação da região interdigital, causando claudicação e lesões de aspecto necrótico purulento, podendo evoluir a comprometimento articular. **OBJETIVO:** Estabelecer a prevalência de casos de pododermatite acometidos em bovinos em uma fazenda na cidade de Autazes-AM, bem como, identificar os possíveis fatores predisponentes da doença. **METODOLOGIA:** Durante um ano foi realizada uma levantamento de dados dos animais acometidos pela pododermatite, levando em consideração a quantidade, características das lesões, diagnóstico e tratamento em uma fazenda localizada em Autazes-AM. A fazenda possuía uma total de 550 bovinos nas raças Holandesas, Girolando e Gir com idades entre 10 a 17 anos, com sistema de criação semi-intensivo. **RESULTADOS:** No total de 14 animais foram acometidos com a patologia. Vale ressaltar que a afecção pododermatite pode ser oriunda de inúmeros fatores, como instalações, na qual em um dos pontos da fazenda havia uma área alagadiça, com ausência de pedilúvio, assim como presença de piso abrasivo na propriedade, com presença de pedregulhos e pedra. Para avaliação dos casos utilizou o escore de locomoção/clauidicação, analisando os animais em estação e caminhando, propondo notas de 1 a 5. Assim, quatro vacas apresentaram graus 4 e 5; e 10 novilhas em grau 2 e 3. Na fazenda, o veterinário realizou o diagnóstico através da anamnese, exame físico, onde foi observado animais com doença da linha branca, hematoma de sola, úlcera de sola, erosão de talão, dermatite digital. Como tratamento foi instituído administração de antibioticoterapia (oxitetraciclina-sete dias/SID), e via tópica, foi realizado associação de neugvon, sulfato de cobre e sulfato de enxofre. Ainda, foi realizado passagem da bandagem, e a correção do piso e de outros fatores. É de extrema importância que haja a profilaxia para evitar problemas futuros, como o uso de pedilúvio com formol 5%, drenagem de áreas aladiças, casqueamento preventivo, corrigir a dieta desses animais. **CONCLUSÃO:** Conclui que foram observados na propriedade alterações podais em alguns animais, oriundos de diversos fatores, logo foram diagnosticados e feito o tratamento dos mesmos, assim como a correção dos fatores, onde posteriormente os animais voltaram a produzir normalmente.

Palavras-chave: Claudicação, Diagnóstico, Profilaxia, Locomoção, Lesões.