



TROMBOFILIA EM PACIENTES COM CÂNCER DE OVÁRIO

RAFAELA VIVAS COSTA; MARIA LUIZA WERNECK; CONRADO LENZI PEREIRA;
CAROLINE DIAS PASTANA; IGOR COSTA SANTOS

INTRODUÇÃO: A trombofilia é um distúrbio hematológico caracterizado por um aumento da tendência à formação de coágulos sanguíneos. Pacientes com câncer de ovário podem apresentar um maior risco de desenvolver tromboembolismo devido a fatores relacionados ao próprio câncer, como a presença de tumores malignos, e ao tratamento antineoplásico utilizado. Neste contexto, é importante compreender a associação entre a trombofilia e o câncer de ovário, a fim de identificar estratégias de prevenção e manejo adequado para esses pacientes. **OBJETIVOS:** O objetivo deste artigo de revisão sistemática é analisar a literatura atual sobre a relação entre a trombofilia e o câncer de ovário. **METODOLOGIA:** A revisão sistemática foi realizada de acordo com as diretrizes do PRISMA. A busca bibliográfica foi conduzida nas bases de dados PubMed, Scopus e Web of Science, utilizando cinco descritores: "trombophilia", "ovarian cancer", "thromboembolism", "risk factors" e "management". Foram estabelecidos critérios de inclusão, como estudos publicados em inglês e revisões sistemáticas que abordaram a trombofilia em pacientes com câncer de ovário. Estudos que não forneceram informações relevantes sobre a trombofilia em pacientes com câncer de ovário ou que não atenderam aos critérios de inclusão foram excluídos. **RESULTADOS:** Foram selecionados 20 artigos. A revisão sistemática revelou uma associação significativa entre a trombofilia e o câncer de ovário. Fatores de risco, como a presença de mutações genéticas, incluindo a mutação do fator V de Leiden e a mutação do gene da protrombina, foram identificados como preditores de maior risco de tromboembolismo em pacientes com câncer de ovário. Além disso, terapia anticoagulante, a quimioterapia e a cirurgia podem contribuir para o aumento do risco de trombose em pacientes com câncer de ovário. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que a trombofilia é uma condição relevante em pacientes com câncer de ovário, aumentando o risco de tromboembolismo e impactando a morbidade e a mortalidade desses pacientes. O reconhecimento precoce dos fatores de risco e a implementação de estratégias de prevenção e tratamento adequadas são fundamentais para melhor o manejo desses pacientes. A identificação de mutações genéticas e outros fatores de risco relacionados à trombofilia pode permitir uma intervenção mais direcionada e individualizada.

Palavras-chave: Trombophilia, Ovarian cancer, Thromboembolism, Risk factors, Management.