



ESCALA DE COMA DE GLASGOW: a importância do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar

ARIANE MOURA DE OLIVEIRA; RITA DE CÁSSIA ALTINO; MÁRCIA APARECIDA NUEVO GATTI

Introdução: A Escala de Coma de Glasgow é responsável pela avaliação de três pontos importantes, sendo eles: abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Obtendo-se assim a avaliação do nível de consciência da vítima, podendo a pontuação variar entre 01 e 15. A avaliação pupilar veio para somar na pontuação, pois ela é responsável por indicar o nível de gravidade das vítimas, porém não deve ser realizada de forma isolada, necessita do conjunto para fechar o diagnóstico. **Objetivos:** Descrever a importância do papel do enfermeiro na avaliação da cena e utilização da ECG no atendimento pré-hospitalar, visando à qualidade do atendimento e intervenções rápidas e necessárias. **Metodologia:** revisão integrativa, método que permite que pesquisas anteriores sejam sumarizadas e conclusões sejam estabelecidas a partir da avaliação crítica de diferentes abordagens metodológicas. A coleta de dados foi realizada no período compreendido entre 2019 e 2024, nas bases de dados Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-Americano e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Bases de Dados Específica da Enfermagem (BDENF) constituindo-se da seguinte pergunta norteadora: Qual a importância da utilização da Escala de Coma de Glasgow por enfermeiros em serviços de urgência e emergência? **Resultados:** Deve-se investir diretamente em capacitações e treinamentos, visando assim um atendimento de qualidade e eficácia, além da redução de danos como sequelas (importância da agilidade nas condutas e terapêuticas aplicadas). **Conclusão:** Comprovou-se o principal público atingido nos casos de TCE, como sendo o sexo masculino devido imprudências no trânsito e a importância das capacitações, simulados e treinamentos dos enfermeiros, os quais são responsáveis pela liderança no atendimento pré-hospitalar.

Palavras-chave: **PUPILAR; TCE; APH**