ATUAÇÃO NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA: COM FOCO EMPACIENTES HIPERTENSOS

FRANCISCO DENIS DE LIMA SARMENTO; MARIA JUCINARIA PEREIRA DEOLIVEIRA SARMENTO; JOYCE THAYNARA DA SILVA MOURA; ANTONIO HANDERSON LIMA AGUIAR; IDELBRANO DE ARAÚJO LIMA JÚNIOR

RESUMO

O tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) é de suma importância na promoção da saúde e na prevenção de complicações cardiovasculares. Além das abordagens farmacológicas tradicionais, a ênfase na intervenção não farmacológica, especificamente a promoção da atividade física, desempenha um papel crucial. A HAS é uma condição de saúde global que requer uma gestão eficaz, e as ESF desempenham um papel fundamental na abordagem holística dessa enfermidade. O tratamento da HAS não se limita ao uso de medicamentos, mas também envolve a educação e a promoção de mudanças no estilo de vida, com destaque para a atividade física. A prática regular de atividade física tem demonstrado consistentemente seu potencial para reduzir a pressão arterial, controlar o peso, melhorar a sensibilidade à insulina e até mesmo reduzir o estresse. Esses benefícios combinados contribuem significativamente para o manejo eficaz da HAS e a prevenção de complicações cardiovasculares.

Palavras-chave: Saúde coletiva; Coordenação; HAS; Atendimento.

1 INTRODUÇÃO

A hipertensão arterial é uma condição crônica que afeta um grande número de pessoas em todo o mundo e é um fator de risco significativo para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Nesse contexto, a ESF aborda a hipertensão não apenas no tratamento da doença, mas também na promoção da educação em saúde, prevenção e controle dos fatores de risco, e na abordagem integral e humanizada do paciente (DE OLIVEIRA et al., 2022).

A educação em saúde é um aspecto essencial da atuação do enfermeiro na ESF. Ele fornece informações sobre a doença, os fatores de risco, a importância da adesão ao tratamento, além de orientar sobre mudanças de estilo de vida saudáveis, como a prática regular de atividades físicas e uma alimentação equilibrada (DE OLIVEIRA et al., 2022). Os profissionais de saúde também participam do planejamento e execução de ações coletivas, como palestras, grupos educativos e campanhas de conscientização, voltadas para a promoção da saúde e prevenção da hipertensão. Além disso, realizam o acompanhamento e monitoramento dos pacientes hipertensos, verificando a adesão ao tratamento, a evolução do quadro clínico e a ocorrência de complicações (DE ANDRADE et al., 2022).

A atuação na ESF, com foco em pacientes hipertensos, envolve o acolhimento, triagem, consulta de enfermagem, educação em saúde, planejamento e execução de ações coletivas, acompanhamento e monitoramento desses pacientes. Essa atuação integrada e em parceria com outros profissionais de saúde visa proporcionar um cuidado abrangente e efetivo para o controle da hipertensão e a promoção da saúde desses indivíduos (SAMPAIO et al., 2020).

O objetivo geral deste trabalho é descrever como se dá o atendimento da APS em doenças crônicas, sobretudo nos cuidados da HAS. Concenituando e narrando seus fatores de

risco bem como seu tratamento.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho trata-se de uma revisão integrativa. Este tipo de revisão engloba a análise significativa das pesquisas que oferecem apoio para tomadas de decisões e aperfeiçoamento da prática clínica, proporcionando a síntese de conhecimento de um determinado assunto, além de apontar falhas que precisarão ser revistas com a realização de novos estudos. Portanto, este método de pesquisa possibilita a síntese de vários estudos publicados, possibilitando conclusões gerais a respeito de uma área de estudo em particular (LUIZ et al., 2018).

Para a construção desta revisão literária, serão utilizadas as seguintes etapas: seleção das questões temáticas; coleta de dados através da base de dados eletrônica, com alguns critérios de inclusão e exclusão para selecionar a amostra; elaboração de um instrumento de coleta com informações de interesses a serem extraídas dos estudos; análise crítica da amostra; interpretação dos dados e apresentação dos resultados.

A revisão de literatura nesse trabalho envolverá publicações indexadas no banco de dados eletrônicos Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e no PubMed. Os descritores utilizados para a busca de estudos são: “Hipertensão Arterial Sistêmica”, “Assistência em saúde”, “Hipertensão Arterial Sistêmica e saúde coletiva”. Também será realizada buscas por seus correspondentes em língua inglesa: “Systemic Arterial Hypertension”, “Health Care”, “Systemic Arterial Hypertension and Collective Health”.

Os critérios de inclusão adotados foram estudos publicados na língua portuguesa disponíveis na forma gratuita e online, e que compartilhassem da temática e objetivo proposto. E quanto aos critérios de exclusão, destaca-se: textos em língua estrangeira incompletos, artigos em forma de resumos e carta ao editor, e que não compartilhassem com a temática em questão.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Conceito de HAS

A hipertensão arterial sistêmica (HAS), popularmente conhecida como pressão arterial elevada, é tida como principal causa de doenças cardiovasculares, causando morbidade e mortalidade. No Brasil, são mais de 38 milhões de brasileiros, com 18 anos ou mais, diagnosticados com a doença, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde (2019), tendo relação direta com a condição de vida da população e não ocorrendo de forma uniforme em países de baixa e média renda (FERREIRA, BODEVAN e DE OLIVEIRA, 2019).

Os países de baixa renda apresentam um aumento expressivo de 31,5%, já os países de alta renda 28,5%. A pressão arterial (PA) varia entre um valor máximo durante a sístole e um valor máximo na diástole. A OMS definiu em 1978 como “uma doença caracterizada por uma elevação crônica da pressão arterial sistólica e/ou pressão arterial diastólica”. No Brasil, o dia 26 de maio é considerado o dia de combate e prevenção à hipertensão arterial sistêmica. A OMS registrou um aumento de casos em pessoas entre 30 e 79 anos, de 650 milhões para 1,28 bilhões nos últimos 30 anos (RIBEIRO e UEHARA, 2022).

3.2 Fatores de risco

Os fatores de risco da HAS podem ser classificados como modificáveis e não modificáveis, e ambos têm papel importante no desenvolvimento da doença. Os fatores de risco modificáveis são aqueles que podem ser controlados e modificados, como o sobrepeso e obesidade, sedentarismo, tabagismo, consumo excessivo de álcool, dieta rica em sódio e estresse. Esses fatores estão diretamente relacionados com o estilo de vida e podem ser

modificados por meio de mudanças no comportamento, dieta e atividade física. Por exemplo, a prática regular de atividade física pode reduzir a pressão arterial, bem como a adesão a uma dieta com baixo teor de sódio e a ingestão de vitaminas pode ser satisfatória para o controle da hipertensão (SANTOS et al., 2022).

Já os fatores de risco não modificáveis são aqueles que não podem ser alterados, como idade, sexo, história familiar, raça, doenças renais e diabetes. Esses fatores estão diretamente relacionados com a genética e com as características individuais de cada pessoa, e podem aumentar o risco de desenvolvimento da HAS. Por exemplo, a hipertensão arterial é mais comum em pessoas acima de 60 anos e em pessoas negras, e a presença de diabetes ou doenças renais pode aumentar o risco de desenvolvimento da HAS (DE BRITO, DIAS e OLIVEIRA, 2020).

Embora os fatores de risco não modificáveis não possam ser alterados, a conscientização sobre eles é importante para que os pacientes possam ser orientados sobre a importância do controle da pressão arterial e adoção de hábitos saudáveis. Além disso, o diagnóstico precoce da HAS é fundamental para o início do tratamento e o controle adequado da doença (SANTOS et al., 2022). Dessa forma, a identificação e o controle dos fatores de risco modificáveis e não modificáveis são importantes para a prevenção e tratamento da hipertensão arterial. É fundamental que os profissionais de saúde orientem os pacientes sobre a importância da adoção de um estilo de vida saudável e do controle adequado da pressão arterial, para que possam evitar as complicações decorrentes da HAS e melhorar a qualidade de vida (DE BRITO, DIAS e OLIVEIRA, 2020).

3.3 Tratamento farmacológico

O tratamento farmacológico da hipertensão arterial sistêmica (HAS) é indicado em casos em que as mudanças no estilo de vida não são suficientes para controlar a pressão arterial ou em pacientes com alto risco cardiovascular. O objetivo do tratamento farmacológico é reduzir a pressão arterial para valores abaixo de 140/90 mmHg, ou abaixo de 130/80 mmHg em pacientes com diabetes ou doença renal (MONTEIRO et al., 2020).

Existem diversas classes de medicamentos disponíveis para o tratamento da HAS, incluindo diuréticos, inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA), bloqueadores dos receptores da angiotensina II (BRA), bloqueadores dos canais de cálcio (BCC), beta-bloqueadores, entre outros. Os diuréticos são frequentemente usados como primeira escolha no tratamento da HAS, pois ajudam a reduzir a pressão arterial ao diminuir o volume de líquidos no organismo. Os IECA e BRA atuam na redução da produção de angiotensina II, um hormônio que causa constrição dos vasos sanguíneos e aumento da pressão arterial. Os BCC reduzem a entrada de cálcio nas células musculares lisas dos vasos sanguíneos, causando relaxamento e dilatação dos vasos. Já os beta-bloqueadores reduzem a frequência cardíaca e a força das contrações do coração, o que também contribui para a redução da pressão arterial (MONTEIRO et al., 2020).

É importante destacar que o tratamento farmacológico deve ser individualizado de acordo com as características e comorbidades do paciente, e a escolha do medicamento deve levar em consideração possíveis efeitos colaterais e interações medicamentosas. Além disso, a adesão ao tratamento é fundamental para o controle efetivo da pressão arterial, e os pacientes devem ser orientados sobre a importância de seguir corretamente a prescrição médica e realizar o monitoramento regular da pressão arterial (MONTEIRO et al., 2020).

4. CONCLUSÃO

A Atenção Primária à Saúde (APS) tem se mostrado um componente fundamental no enfrentamento das doenças crônicas, especialmente no cuidado à hipertensão arterial sistêmica (HAS). A estruturação do atendimento na APS visa a garantir um acompanhamento

contínuo e integral dos pacientes, promovendo ações de prevenção e controle que vão além do simples tratamento farmacológico. A identificação precoce da hipertensão é crucial para evitar complicações graves, como doenças cardiovasculares e renais, que muitas vezes decorrem do controle inadequado da pressão arterial. Nesse sentido, a APS tem um papel estratégico na construção de uma linha de cuidado efetiva, que acompanha o paciente desde a detecção da doença até o manejo dos seus fatores de risco.

Os fatores de risco associados à hipertensão são amplamente conhecidos e envolvem hábitos de vida como alimentação inadequada, sedentarismo, consumo excessivo de sal, tabagismo e uso abusivo de álcool. A APS, por meio de suas equipes de saúde multidisciplinares, tem a capacidade de atuar diretamente na modificação desses fatores, oferecendo orientações de estilo de vida saudável, apoio psicológico e intervenções educativas que contribuem para a redução da prevalência da HAS na população. Além disso, o acompanhamento regular e próximo dos pacientes permite ajustes terapêuticos mais precisos e intervenções oportunas, prevenindo a progressão da doença e suas complicações.

Um aspecto importante do cuidado na APS é a promoção da autonomia do paciente no manejo de sua própria saúde. Ao educar os pacientes sobre a importância do autocuidado e fornecer ferramentas para que eles possam monitorar e controlar sua pressão arterial, a APS promove uma mudança de comportamento que pode levar a melhores resultados em saúde. O fortalecimento do vínculo entre os profissionais de saúde e os pacientes também é um fator chave, já que um relacionamento de confiança e comunicação aberta facilita a adesão ao tratamento e às orientações médicas.

Finalmente, o trabalho evidencia a necessidade de políticas públicas que reforcem a estrutura da APS no Brasil, garantindo que todos os cidadãos, especialmente aqueles em situações de vulnerabilidade social, tenham acesso a cuidados de saúde de qualidade. A APS deve ser vista como o alicerce do sistema de saúde, desempenhando um papel crucial na prevenção de doenças e na promoção da saúde em nível comunitário. A continuidade do investimento em estratégias de fortalecimento da APS é essencial para enfrentar os desafios das doenças crônicas, como a hipertensão, e assegurar uma assistência mais equitativa e eficaz para toda a população.

REFERÊNCIAS

BATISTA, Gabriella Farias et al. Principais fatores que influenciam na adesão do tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica: uma revisão integrativa. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 1, p. e26311124760-e26311124760, 2022.

CARVALHO, Fabio Fortunato Brasil de. A atividade física no discurso governamental brasileiro: Análise de alguns meios de comunicação à sociedade. 2020.

CARVALHO, Tatiana Resende; RIBEIRO, Luiz Cláudio. Associação entre letramento funcional em saúde e adesão ao tratamento medicamentoso da hipertensão arterial sistêmica na atenção primária à saúde. *Revista de APS*, v. 23, n. 4, 2020.

DE ANDRADE, Ana Fátima Souza Melo et al. A atuação do enfermeiro na prevenção da Insuficiência Renal Crônica em pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 15, p. e234101523044- e234101523044, 2021.

DE ANDRADE, Ducicléia Pereira; DE MELLO, Rafael Luciano. Benefícios da atividade física à saúde e qualidade de vida do idoso. *Caderno Intersaberes*, v. 11, n. 31, p. 31-41, 2022.

DE BRITO, Veronica Perius; DIAS, Fellipe Leonardo Torres; OLIVEIRA, Stefan. Hipertensão arterial sistêmica, uso de bloqueadores dos receptores de angiotensina II e inibidores da enzima conversora da angiotensina e COVID-19: Uma revisão sistemática. *InterAmerican Journal of Medicine and Health*, v. 3, 2020.

DE OLIVEIRA, Susiany Ferreira et al. Ações de educação em saúde de enfermeiros da equipe de saúde da família na assistência ao indivíduo com hipertensão arterial sistêmica: revisão integrativa. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 12, p. e142111233989-e142111233989, 2022.

DOS SANTOS PEREIRA, Isabela et al. Avaliação da não adesão ao tratamento farmacológico da hipertensão arterial sistêmica em uma população de Salvador-BA. *Brazilian Journal of Development*, v. 7, n. 1, p. 153-174, 2021.

FERREIRA, Paola Aparecida Alves; BODEVAN, Emerson Cotta; DE OLIVEIRA, Leida Calegário. Características sociodemográficas associadas à prevalência de hipertensão arterial sistêmica. *Revista da Universidade Vale do Rio Verde*, v. 17, n. 1, 2019.

GIL, Antônio Carlos. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

LIMA, Maely Nicolino et al. Influência do acompanhamento farmacoterapêutico no tratamento medicamentoso da hipertensão arterial sistêmica em idosos: revisão sistemática. 2019.

MAXIMO, Samuel Amano; ANDREAZZA, Rosemarie; CECILIO, Luiz Carlos de Oliveira. Assistência farmacêutica no cuidado à saúde na Atenção Primária: tão perto, tão longe. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, v. 30, n. 1, p. e300107, 2020.

MIELKE, Gregore Iven et al. Atividade física para gestantes e mulheres no pós-parto: Guia de Atividade Física para a População Brasileira. *Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde*, v. 26, p. 1-10, 2021.

MONTEIRO, Ariane Alice Fernandes et al. Estudo sobre a adesão ao tratamento de hipertensão arterial sistêmica na UBSF de Três Poços. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 3, n. 1, p. 1289-1305, 2020.

MOREIRA, Isabella Tessmann; RAICHLE, Vitória Gorini. Não adesão ao tratamento medicamentoso para hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus: VIGITEL 2019.

RIBEIRO, Ana Cristina; UEHARA, Sílvia Carla da Silva André. Hipertensão arterial sistêmica como fator de risco para a forma grave da COVID-19: revisão de escopo. *Revista de Saúde Pública*, v. 56, 2022.

SAMPAIO, Samyra Maria Lima et al. Atuação de enfermagem frente ao atendimento ao paciente hipertenso: uma revisão integrativa. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, n. 50, p. e3526-e3526, 2020.

SANTOS, Lucas Gomes et al. Prevalência de Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus em Indivíduos com COVID-19: Um Estudo Retrospectivo de Óbitos em Pernambuco, Brasil. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, v. 117, p. 416- 422, 2021.