



LACTENTES DE SETE MESES COM ANEMIA POR DEFICIÊNCIA DE FERRRO

HELENICE RITA DE JESUS CARVALHO; IEDA APARECIDA DINIZ; MÁRCIA CHRISTINA CAETANO ROMANO

Introdução: Em nível global a principal causa de anemia entre as crianças tem sido a deficiência de ferro. Embora ações governamentais tenham sido realizadas, o índice da anemia continua alto neste público. **Objetivo:** Descrever a prevalência de anemia em lactentes aos 7 meses de idade. **Material e Métodos:** Trata-se de um estudo transversal, realizado em uma maternidade de referência em atendimentos do SUS para a região centro-oeste mineira, localizada no Município de Divinópolis. Participou do estudo uma amostra aleatória de 229 crianças nascidas na instituição, avaliadas aos sete meses de idade quanto à dosagem de hemoglobina por meio do hemoglobinômetro portátil Hemocue201. Às mães aplicou-se o questionário de marcadores de consumo alimentar do Ministério da Saúde e um formulário elaborado pelos autores com dados de identificação e histórico de saúde. As variáveis categóricas foram descritas em frequência absoluta e porcentagem e as variáveis quantitativas foram apresentadas em média. **Resultados:** Das crianças participantes do estudo 121 (52,8%) são do sexo feminino, 168 (73,3%), nasceram de parto vaginal, e 57 (24,8%) crianças tiveram o clampeamento do cordão após um minuto. Sobre o histórico do uso de sulfato ferroso 210 mães (91,7%) relataram uso rotineiro durante a gestação, 41 (18%), apresentaram anemia em algum período da gravidez, destas três (7,5%) das mães não realizaram o tratamento proposto. Em relação a hemoglobina, 84 (36,7%) crianças apresentam valor inferior a 110 mg/dl, com média de 109 mg/dl. 37 (16,1%) não estavam em uso de sulfato ferroso aos sete meses de idade. A média do peso das crianças foi 7763 Kg, peso mínimo de 5230 Kg e máximo 10.600 Kg. A altura variou de 59 a 79 cm, com média de 66,28. **Conclusão:** Foram levantadas neste estudo variáveis importantes para o desfecho de anemia ferropriva, como anemia materna, tipo de parto, tempo de clampeamento do cordão, uso e adesão do sulfato ferroso profilático ofertado na ESF para a mãe e o lactente, dados que carecem ser analisados com maior profundidade. Pode se considerar a prevalência expressiva de anemia aos sete meses, evento que tem também acontecido em outros cenários e faixas etárias.

Palavras-chave: **ANEMIA; ANEMIA FERROPRIVA; ANEMIA NUTRICIONAL; LACTENTES; PROFILAXIA**