



CONDUTA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE NO TRATAMENTO CLÍNICO DA TAQUICARDIA VENTRICULAR MONOMÓRFICA EM PACIENTES COM HIPERTIREOIDISMO SECUNDÁRIO: REVISÃO DE LITERATURA

JOSÉ VICTOR DANTAS DOS SANTOS; JOÃO ANTONIO MOUTINHO JÚNIOR; VITÓRIA GUEDES RODRIGUES NUNES NICOLAU; KAREN EDUARDA DE SOUZA BARBOSA COSTA; SOFIA FEITOSA ALEXANDRINO

Introdução: O hipertireoidismo secundário (HS), causado pela produção excessiva de hormônios tireoidianos por fatores externos, pode causar complicações cardíacas graves, como a taquicardia ventricular monomórfica (TVM). Esta condição, caracterizada por batimentos rápidos e regulares do ventrículo, pode resultar em arritmias fatais. A atenção primária em saúde é crucial para identificar e manejar esta condição, além de encaminhar adequadamente para cuidados especializados. **Objetivo:** O objetivo deste estudo é revisar a literatura existente sobre o papel da atenção primária no manejo clínico da taquicardia ventricular monomórfica em pacientes com hipertireoidismo secundário, enfatizando as melhores práticas e os desafios enfrentados pelos profissionais de saúde. **Metodologia:** O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, descritiva e comparativa, elaborada com base em estudos relacionados ao tratamento clínico da taquicardia ventricular monomórfica em pacientes com HS. A pesquisa foi realizada no primeiro semestre de 2024, por meio de pesquisa nas bases de dados PubMed, LILACS, na biblioteca virtual SciELO, e de buscas manuais com base nos seguintes descritores: Atenção Primária; Taquicardia Ventricular Monomórfica; Hipertireoidismo Secundário. Utilizou-se o operador booleano “AND” e os critérios de inclusão e exclusão foram, respectivamente, artigos publicados nos últimos 5 anos e estudos incompletos ou realizados antes de 2020. **Resultados:** A TVM é uma complicação severa do HS. Embora rara, a literatura médica relata casos de pacientes com HS que desenvolvem esta condição, sublinhando a importância do rastreamento cuidadoso. Profissionais de saúde devem estar atentos aos sinais clínicos, permitindo a identificação precoce e intervenções iniciais, como monitoramento dos sinais vitais e administração de antiarrítmicos, especialmente propranolol. Medicamentos antitireoidianos, como metimazol, reverterem a tireotoxicose de forma eficaz. Após estabilização, é crucial encaminhar os pacientes a especialistas, como cardiologistas e endocrinologistas. A educação sobre adesão ao tratamento e vigilância contínua são essenciais. Desafios como complexidade clínica, limitações de recursos e dificuldades na adesão podem dificultar a condução competente na atenção básica. **Conclusão:** A atenção primária em saúde é essencial no manejo da TVM em pacientes com HS. Uma abordagem integrada melhora desfechos clínicos e qualidade de vida. Há uma lacuna no tratamento e pesquisa, demandando capacitação contínua dos profissionais e diretrizes eficazes.

Palavras-chave: **ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE; CARDIOPATIAS; ENDOCRINOPATIAS; HIPERTIREOIDISMO SECUNDÁRIO; TAQUICARDIA VENTRICULAR MONOMÓRFICA**