



ABANDONO DA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL EM UM MUNICÍPIO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

CAROLINE FOURNIER TESTONI; AMÉLIA LUZA; FREDERICO ALVES DIAS; YANNA DANTAS RATTMANN

Introdução: A adesão ao tratamento antirretroviral proporciona a redução da carga do vírus HIV e impede que a infecção evolua para a AIDS. Desde o ano de 1996, a terapia antirretroviral (TARV) é fornecida pelo SUS para todas as pessoas que receberem o diagnóstico da infecção pelo HIV. Entretanto, apesar da TARV ser gratuita e efetiva, os casos de abandono da TARV após iniciada são frequentes e comprometem o controle da doença. **Objetivo:** Investigar o abandono da terapia antirretroviral pela população em tratamento contra o HIV do município de Piraquara-PR. **Metodologia:** Trata-se de um estudo observacional, descritivo, com delineamento transversal, utilizando dados secundários do ano de 2023, provenientes de relatórios de sistemas informatizados fornecidos pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. São consideradas pessoas em abandono da TARV aquelas que se encontram há mais de 100 dias sem buscar os medicamentos antirretrovirais nas unidades dispensadoras de medicamentos, serviços que centralizam o fornecimento dos medicamentos a todas as pessoas com HIV. **Resultados:** Foram identificadas 140 pessoas em abandono de TARV. Prevaleram as pessoas do sexo feminino (52,86%), entre 30 e 49 anos (52,86%), brancas (73,57%), escolaridade não informada/ignorada (42,86%) e tempo entre 18 a 42 meses (23,57%) de abandono da terapia antirretroviral. Grande parte da população (45%) busca seus medicamentos em unidades dispensadoras fora do município de Piraquara. **Conclusão:** Existem muitos fatores associados ao abandono da TARV, entre os quais a dificuldade de acesso aos locais de atendimento e fatores relacionados aos determinantes sociais, como a escolaridade. A descentralização da dispensação dos medicamentos poderia facilitar o acesso, reduzir custos de deslocamento e estimular a adesão ao tratamento.

Palavras-chave: HIV; AIDS; TRATAMENTO ANTIRRETROVIRAL; ABANDONO DA TERAPIA; ADESÃO AO TRATAMENTO