



CLAMÍDIA E A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE A EVITAR IMPACTOS NA SAÚDE FEMININA

HELENA ABBUD GASPAR; TATIANA DENADAI OLIVEIRA MENEZES; ISABELLA RIBEIRO DA ROCHA

Introdução: A *Chlamydia Trachomatis* é uma bactéria do tipo cocos, gram negativa, classificada como uma infecção sexualmente transmissível (IST) que acomete tanto homens quanto mulheres, da qual pode cursar no hospedeiro de forma sintomática ou assintomática, em sua maioria. A clamídia inicia-se na endocérvice uterina e pode ter uma resolução espontânea, porém, em algumas mulheres, ela pode ascender no trato genital superior e causar um quadro de infecção, denominado doença inflamatória pélvica (DIP), uma vez dado dano tubário ou períodos longos de infecção, a clamídia pode evoluir para sofrimentos irreversíveis como a infertilidade, ou prejuízos potencialmente fatais como a gravidez ectópica. Por não ser possível fornecer rastreio para toda a população feminina geral, ela é considerada um problema de saúde pública, já que caso não haja o diagnóstico precoce, traz impacto importante relacionado à saúde feminina.

Objetivo: Analisar a importância do rastreio e do diagnóstico precoce da clamídia, para que se evite complicações como doença inflamatória pélvica (DIP) e infertilidade.

Metodologia: O resumo trata-se de uma revisão de literatura, realizado através de um levantamento bibliográfico a partir de dados obtidos no Google Acadêmico com pesquisas que possuem resultados a partir de 2021, utilizando os termos "clamídia" e "doença inflamatória pélvica" e os principais tópicos excluídos foram os que não atendiam à temática.

Resultados: Como a clamídia possui uma alta taxa de manifestações assintomáticas, o diagnóstico precoce acaba sendo dificultado devido a ausência de sintomas, ademais, o rastreio desta bactéria no Brasil é raro de ser fornecido pelos serviços de saúde como parte de uma consulta ginecológica de rotina. Com a inacessibilidade aos testes diagnósticos, do qual o método de cultura da secreção vaginal é considerado padrão-ouro, essa enfermidade pode evoluir para DIP, podendo até mesmo causar obstrução tubária, tornando improvável uma gravidez nas mulheres em idade fértil. **Conclusão:** O adequado rastreio e diagnóstico, junto com seu tratamento precoce, é de extrema importância para a saúde feminina para que evite complicações fatais. A carência para fornecer tais testes à população feminina do Brasil ainda é um dos desafios a serem enfrentados para erradicar sequelas irreversíveis.

Palavras-chave: **CLAMÍDIA; INFERTILIDADE; DOENÇA; DIAGNÓSTICO; RASTREIO**