



CÂNCER DE COLO DE ÚTERO: ANÁLISE DA INCIDÊNCIA ENTRE OS ANOS DE 2020 E 2024 NO ESTADO DE GOIÁS

FLÁVIO HENRIQUE DE ALMEIDA FEITOZA FILHO; HUGO CÉSAR DA CRUZ CORRÊA; LAYSA RAFAELA SILVA GUARESCHI; LÍGIA LEAL VITA; MARINA CABRAL LEÃO

RESUMO

Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, o câncer de colo de útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre as mulheres. A princípio, o câncer de colo de útero, também pode ser denominado de câncer cervical, sendo causado pela infecção persistente de alguns tipos de Papiloma vírus Humano (HPV). No Brasil, existem programas de detecção precoce, que consiste no diagnóstico precoce e no rastreamento. Os principais sinais e sintomas descritos nas literaturas, envolve o sangramento vaginal anormal, secreções vaginais anormais (de acordo com a quantidade, cor e odor), dor pélvica, desconforto ou sangramento durante as relações sexuais e alterações intestinais ou urinárias. O tratamento é feito a partir do estadiamento disponibilizado pela Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO), que classifica o câncer de colo de útero em estágios que variam de I ao IV. Este resumo expandido, tem como objetivo traçar o perfil de incidência dos casos de câncer de colo uterino, de acordo com sua classificação nas mulheres acometidas, no período de 2020 a 2024 em Goiás. Os dados utilizados para tal análise foram retiradas do Departamento de Informática do SUS (DATASUS), analisando um período de 5 anos (2020 a 2024). Foram encontrados e analisados os dados sobre o total de mulheres que realizaram o exame histopatológico e os resultados obtidos através dos laudos de tal exame. Nos laudos histopatológicos, as classificações encontradas correspondem as seguintes: Carcinoma epidermóide, Adenocarcinoma invasor, Adenocarcinoma in situ, Neoplasia intraepitelial cervical de grau I (NIC I), Neoplasia intraepitelial cervical de grau II (NIC II), Neoplasia intraepitelial ou cervical de grau III (NIC III), outras neoplasias, achados benignos e achados insatisfatórios. Neste trabalho, foi possível elucidar que o tipo de alteração mais frequente foi o NIC I, NIC II e NIC III. Além disso, evidencia-se que a maioria dos laudos, obtiveram resultados benignos.

Palavras-chave: Câncer de Colo Uterino; Câncer de Colo de Útero; Incidência do Câncer de Colo Uterino; Câncer de Colo Uterino no Brasil; Papiloma vírus Humano

1 INTRODUÇÃO

Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, o câncer de colo de útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre as mulheres. Em uma análise de parâmetro regional, destacamos a Região Norte como mais incidente, sendo acompanhada, respectivamente, por Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste.

A princípio, o câncer de colo de útero, também pode ser denominado de câncer cervical, sendo causado pela infecção persistente de alguns tipos de Papilomavírus Humano (HPV), conhecidos como oncogênicos.

No Brasil, atualmente, existem estratégias para a detecção precoce, que consiste no diagnóstico precoce, que é feito examinando pessoas com sinais e sintomas sugestivos da doença, e o rastreamento, conhecido pela aplicação de exames que buscam identificar a

presença de lesões precursoras do câncer.

Os principais sinais e sintomas descritos nas literaturas, envolve o sangramento vaginal anormal, secreções vaginais anormais (de acordo com a quantidade, cor e odor), dor pélvica, desconforto ou sangramento durante as relações sexuais e alterações intestinais ou urinárias. Vale ressaltar que cada caso é único, sendo, portanto, comum a ocorrência de outros sintomas associados ou de aparição exclusiva.

O diagnóstico é feito por meio de testes, sendo os mais utilizados, exames pélvicos e história clínica, como exame de vagina e colo de útero, avaliação com espéculo, toque vaginal, Papanicolau e biópsia de lesões sugestivas.

Após o diagnóstico do câncer de colo uterino ter sido realizado, a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO) preconiza o estadiamento dos tumores presentes no colo do útero para que o tratamento seja feita de forma adequada, garantindo assim, um prognóstico melhor às pacientes. De acordo com o sistema utilizado pela FIGO, pode-ser classificar esse tipo de câncer em estágios que vão de I ao IV, sendo eles:

- Estágio I: carcinoma estritamente confinado ao colo uterino (não considerar extensão para o corpo uterino).
- Estágio IA: carcinoma invasivo diagnosticado apenas por microscopia, com profundidade máxima de invasão ≤ 5 mm.
- Estágio IA1: Invasão estromal < 3 mm de profundidade (a área invadida pelo câncer tem 3mm de profundidade).
- Estágio IA2: Invasão estromal ≥ 3 mm e ≤ 5 mm de profundidade.
- Estágio IB: carcinoma invasivo com profundidade máxima de invasão > 5 mm, porém a lesão é restrita ao colo uterino.
- Estágio IB1: carcinoma invasivo com profundidade de invasão estromal > 5 mm, e < 2 cm em sua maior dimensão.
- Estágio IB2: carcinoma invasivo ≥ 2 cm e < 4 cm em sua maior dimensão.
- Estágio IB3: carcinoma invasivo ≥ 4 cm em sua maior dimensão.
- Estágio II: Carcinoma invade além do útero, mas sem extensão ao terço inferior da vagina ou à parede da pelve.
- Estágio IIA: acometimento limitado aos dois terços superiores da vagina, sem invasão de paramétrios.
- Estágio IIA1: carcinoma invasivo com < 4 cm em sua maior dimensão.
- Estágio IIA2: carcinoma invasivo com ≥ 4 cm em sua maior dimensão.
- Estágio IIB: com invasão parametrial, mas sem extensão à parede da pelve.
- Estágio III: carcinoma acomete o terço inferior da vagina e/ou se estende à parede da pelve e/ou causa hidronefrose ou perda de função renal e/ou invade os linfonodos pélvicos e/ou para-aórticos.
- Estágio IIIA: carcinoma acomete o terço inferior da vagina, mas sem extensão à parede pélvica.
- Estágio IIIB: extensão à parede da pelve e/ou hidronefrose ou perda de função renal (exceto quando sabidamente decorrente de outras causas).
- Estágio IIIC: invasão dos linfonodos pélvicos e/ou para-aórticos, independentemente do tamanho e extensão do tumor.
- Estágio IIIC1: metástase somente em linfonodos pélvicos.
- Estágio IIIC2: metástase em linfonodos para-aórticos.
- Estágio IV: carcinoma estende-se além da pelve verdadeira ou envolve (com confirmação em biópsia) a mucosa da bexiga ou do reto. (Edema bolhoso, por si só, não permite que o caso seja classificado como Estágio IV).
- Estágio IVA: disseminação para órgãos pélvicos adjacentes.
- Estágio IVB: disseminação para outros órgãos à distância.

Existem diversas formas de tratamento, que serão aplicadas conforme o estadiamento e

fatores pessoais, como idade do paciente e desejo de ter filho.

Esse tipo de câncer continua sendo um problema para a saúde pública do país, uma vez que as taxas de mortalidade são elevadas. O que nos faz refletir que as políticas públicas estabelecidas ainda não repercutiram nas ações de controle.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Este é um estudo transversal descritivo, de informações coletadas no Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Foram coletadas informações do tópico “Epidemiológicas e Morbidade” provenientes do sistema TabNet.

As principais informações foram resultado do relatório denominado “Sistema de Informação do Câncer - SISCAN (Colo do útero e mama”. A região analisada corresponde ao estado de Goiás.

Foram analisados dados do período de 5 anos (2020, 2021, 2022, 2023 e 2024), tendo como referência pacientes por laudo histopatológico segundo faixa etária, com base no acometimento no estado de Goiás. Foram coletados dados anuais e comparados entre si a fim de estabelecer quais as classificações de câncer de colo uterino são mais prevalentes e quais faixas etárias que mais realizaram o exame histopatológico.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos laudos histopatológicos, as classificações encontradas correspondem as seguintes: Carcinoma epidermóide, Adenocarcinoma invasor, Adenocarcinoma in situ, Neoplasia intraepitelial cervical de grau I (NIC I), Neoplasia intraepitelial cervical de grau II (NIC II), Neoplasia intraepitelial ou cervical de grau III (NIC III), outras neoplasias, achados benignos e achados insatisfatórios.

Analisando os dados, temos que em 2020, houve um total de 643 laudos histopatológicos, sendo mais prevalente os achados benignos (175 casos), seguido de NIC I (162 casos), NIC III (122 casos), NIC II (87 casos), carcinoma epidermóide (56 casos), outras neoplasias (18 casos), resultado insatisfatório (14 casos), adenocarcinoma in situ (6 casos) e adenocarcinoma invasor (3 casos), conforme a tabela abaixo (Tabela 1).

Ainda sobre a faixa etária de realização do exame histopatológico temos uma prevalência em mulheres de 40 a 44 anos, seguido de 35 a 39 anos, e de 30 a 34 anos.

Tabela 1. Fonte: Sistema de Informações de Câncer (SISCAN)

Idade (anos)	2020	2021	2022	2023	2024	Total
0-4	0	0	0	0	0	0
5-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0
25-29	0	0	0	0	0	0
30-34	1	1	1	1	1	5
35-39	2	2	2	2	2	10
40-44	3	3	3	3	3	15
45-49	4	4	4	4	4	20
50-54	5	5	5	5	5	25
55-59	6	6	6	6	6	30
60-64	7	7	7	7	7	35
65-69	8	8	8	8	8	40
70-74	9	9	9	9	9	45
75-79	10	10	10	10	10	50
80-84	11	11	11	11	11	55
85-89	12	12	12	12	12	60
90-94	13	13	13	13	13	65
95-99	14	14	14	14	14	70

Data de atualização dos dados: 20/06/2024

Já no ano de 2021, totalizaram 1095 laudos histopatológicos, sendo 420 casos benignos, 211 casos de NIC III, 145 casos de NIC I, 112 casos de NIC II, 88 casos de outras neoplasias, 66 casos de carcinoma epidermóide, 27 resultados insatisfatórios, 16 casos de adenocarcinoma invasor e 10 casos de adenocarcinoma in situ. A principal faixa a realizar o exame foi entre os 35 e 39 anos, seguida de mulheres entre 40 a 44 anos (Tabela 2).

Tabela 2. Fonte: Sistema de Informações de Câncer (SISCAN)

Exatidão	Carcinoma Epidermóide	Adenocarcinoma Invasor	Adenocarcinoma In Situ	NIC III	NIC II	NIC I	Carcinoma Epidermóide	Outras Neoplasias	Insatisfatórios	Total
2021	404	186	145	24	18	10	8	10	10	1083
2022	404	186	145	24	18	10	8	10	10	1083
2023	495	232	178	120	66	232	9	6	9	1158
2024	208	99	83	99	83	99	9	6	9	489

Data de atualização dos dados: 20/06/2024

No ano de 2022, houve uma diminuição dos laudos histopatológicos em relação à 2021, totalizando 1083 laudos. Analisando os resultados, temos maior prevalência em achados benignos (404 resultados), seguido de 239 casos de NIC I, 186 casos de NIC III, 145 casos de NIC II, 49 casos de carcinoma epidermóide, 24 resultados de outras neoplasias, 18 casos de adenocarcinoma invasor, 10 resultados insatisfatórios e 8 casos de adenocarcinoma in situ. Aqui a faixa etária aumenta para mulheres de 40 a 44 anos (Tabela 3).

Tabela 3. Fonte: Sistema de Informações de Câncer (SISCAN)

Exatidão	Carcinoma Epidermóide	Adenocarcinoma Invasor	Adenocarcinoma In Situ	NIC III	NIC II	NIC I	Carcinoma Epidermóide	Outras Neoplasias	Insatisfatórios	Total
2021	404	186	145	24	18	10	8	10	10	1083
2022	404	186	145	24	18	10	8	10	10	1083
2023	495	232	178	120	66	232	9	6	9	1158
2024	208	99	83	99	83	99	9	6	9	489

Data de atualização dos dados: 20/06/2024

As análises do ano de 2023, mostram que houve um aumento no número total de laudos histopatológicos, tendo como resultado 1158 resultados. Seguindo a mesma prevalência dos anos anteriores, temos os achados benignos liderando o topo de resultados, com um total de 495 casos. Em relação aos demais achados, temos 232 casos de NIC I, 178 casos de NIC III, 120 casos de NIC II, 66 casos de carcinoma epidermóide, 32 casos de outras neoplasias, 20 achados insatisfatórios, 9 casos de adenocarcinoma em situ e 6 casos de adenocarcinoma invasor. A faixa etária de maior realização de exames histopatológicos nesse ano foi de 45 a 49 anos (Tabela 4).

Tabela 4. Fonte: Sistema de Informações de Câncer (SISCAN)

Exatidão	Carcinoma Epidermóide	Adenocarcinoma Invasor	Adenocarcinoma In Situ	NIC III	NIC II	NIC I	Carcinoma Epidermóide	Outras Neoplasias	Insatisfatórios	Total
2021	404	186	145	24	18	10	8	10	10	1083
2022	404	186	145	24	18	10	8	10	10	1083
2023	495	232	178	120	66	232	9	6	9	1158
2024	208	99	83	99	83	99	9	6	9	489

Data de atualização dos dados: 20/06/2024

Por fim, no ano de 2024, os dados coletados ainda não foram finalizados em virtude do ano ainda não ter acabado. Mas os dados já notificados para o SINAN, totalizaram 489 laudos histopatológicos, sendo desses 208 casos de achados benignos, 99 casos de NIC I, 83 casos de

NIC III, 53 casos de NIC II, 26 casos de carcinoma epidermóide, 13 casos de outras neoplasias, 4 casos de adenocarcinoma invasor e 3 achados insatisfatórios. Em relação a faixa etária, houve um maior número em mulheres entre 40 e 44 anos (Tabela 5).

Tabela 5. Fonte: Sistema de Informações de Câncer (SISCAN)

Pacientes	Carcinoma Epidermóide	Adenocarcinoma Invasor	NIC III	NIC II	NIC I	Outras neoplasias	Insatisfatório	Total
Total	26	4	53	26	13	206	3	439
Ano 2020	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 15 e 19 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 20 e 24 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 25 e 29 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 30 e 34 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 35 e 39 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 40 e 44 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 45 e 49 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 50 e 54 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 55 e 59 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 60 e 64 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 65 e 69 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 70 e 74 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 75 e 79 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 80 e 84 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 85 e 89 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 90 e 94 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 95 e 99 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 100 e 104 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 105 e 109 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 110 e 114 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 115 e 119 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 120 e 124 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 125 e 129 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 130 e 134 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 135 e 139 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 140 e 144 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 145 e 149 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 150 e 154 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 155 e 159 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 160 e 164 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 165 e 169 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 170 e 174 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 175 e 179 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 180 e 184 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 185 e 189 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 190 e 194 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 195 e 199 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 200 e 204 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 205 e 209 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 210 e 214 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 215 e 219 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 220 e 224 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 225 e 229 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 230 e 234 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 235 e 239 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 240 e 244 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 245 e 249 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 250 e 254 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 255 e 259 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 260 e 264 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 265 e 269 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 270 e 274 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 275 e 279 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 280 e 284 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 285 e 289 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 290 e 294 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 295 e 299 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 300 e 304 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 305 e 309 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 310 e 314 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 315 e 319 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 320 e 324 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 325 e 329 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 330 e 334 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 335 e 339 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 340 e 344 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 345 e 349 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 350 e 354 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 355 e 359 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 360 e 364 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 365 e 369 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 370 e 374 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 375 e 379 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 380 e 384 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 385 e 389 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 390 e 394 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 395 e 399 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 400 e 404 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 405 e 409 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 410 e 414 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 415 e 419 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 420 e 424 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 425 e 429 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 430 e 434 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 435 e 439 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 440 e 444 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 445 e 449 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 450 e 454 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 455 e 459 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 460 e 464 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 465 e 469 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 470 e 474 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 475 e 479 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 480 e 484 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 485 e 489 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 490 e 494 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 495 e 499 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 500 e 504 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 505 e 509 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 510 e 514 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 515 e 519 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 520 e 524 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 525 e 529 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 530 e 534 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 535 e 539 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 540 e 544 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 545 e 549 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 550 e 554 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 555 e 559 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 560 e 564 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 565 e 569 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 570 e 574 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 575 e 579 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 580 e 584 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 585 e 589 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 590 e 594 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 595 e 599 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 600 e 604 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 605 e 609 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 610 e 614 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 615 e 619 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 620 e 624 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 625 e 629 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 630 e 634 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 635 e 639 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 640 e 644 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 645 e 649 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 650 e 654 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 655 e 659 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 660 e 664 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 665 e 669 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 670 e 674 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 675 e 679 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 680 e 684 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 685 e 689 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 690 e 694 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 695 e 699 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 700 e 704 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 705 e 709 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 710 e 714 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 715 e 719 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 720 e 724 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 725 e 729 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 730 e 734 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 735 e 739 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 740 e 744 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 745 e 749 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 750 e 754 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 755 e 759 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 760 e 764 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 765 e 769 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 770 e 774 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 775 e 779 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 780 e 784 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 785 e 789 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 790 e 794 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 795 e 799 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 800 e 804 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 805 e 809 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 810 e 814 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 815 e 819 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 820 e 824 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 825 e 829 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 830 e 834 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 835 e 839 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 840 e 844 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 845 e 849 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 850 e 854 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 855 e 859 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 860 e 864 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 865 e 869 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 870 e 874 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 875 e 879 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 880 e 884 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 885 e 889 anos	1	1	1	1	1	1	1	7
Entre 890 e 894 anos	1	1	1	1</				