



ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS DE SÍFILIS CONGÊNITA NO DISTRITO FEDERAL SEGUNDO ESCOLARIDADE E FAIXA ETÁRIA DAS MÃES

SAMARA DOMIENSE CAMPOS; SAMARA DOMIENSE CAMPOS; ANA BEATRIZ ARANTES LOPES; DAYANA PEREIRA SANTANA; BRUNA DA SILVA SOUSA

Introdução : A sífilis congênita é uma doença infecciosa transmitida da mãe para o feto durante a gestação, resultando em consequências para o bebê, incluindo aborto espontâneo, natimortalidade ou malformações. A notificação e análise dos casos por faixa etária da mãe são essenciais para direcionar políticas públicas de saúde e intervenções preventivas. **Objetivo** : identificar a distribuição dos casos confirmados de sífilis congênita no Distrito Federal, segundo a faixa etária da mãe, no ano de 2023, e associar esses dados a possíveis implicações para a saúde pública. **Metodologia** : Este estudo utiliza dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde, disponibilizados pelo Departamento de tabulação de dados do Sistema Único de Saúde (DATASUS), referentes ao ano de 2023. A análise abrange a distribuição dos casos confirmados de sífilis congênita no Distrito Federal, categorizadas pela faixa etária da mãe. A coleta de dados foi realizada por meio da ferramenta digital pública de tabulação dos dados do Sistema Único de Saúde (TABNET), com filtragem por região/município e faixas etárias lançadas no ano de 2023. Os critérios de exclusão foram dados ignorados ou não disponíveis, e os critérios de inclusão foram casos de sífilis congênita no Distrito Federal. **Resultados** : Foram notificados um total de 223 casos confirmados de sífilis congênita no Distrito Federal. A maior parte dos casos ocorreu em mulheres entre 20 e 24 anos (84 casos), seguida por 25 a 29 anos (46 casos) e 30 a 34 anos (36 casos). Destaca-se que houve uma gestante entre 10 e 14 anos, contabilizando um caso, além de dois casos sem faixa etária registrada no Distrito Federal. As faixas etárias com maior frequência de ocorrência estão de acordo com o período de maior fecundidade descrito pela literatura. É evidente a necessidade de campanhas públicas e ações de educação em saúde que permitam a conscientização das jovens gestantes, tendo em vista que as ferramentas de detecção e intervenções precoces são determinantes para a redução do número de casos no Distrito Federal. **Conclusão** : A maioria dos casos de sífilis congênita ocorreu em mães na faixa etária de 20 a 24 anos.

Palavras-chave: **SAUDE; INFECÇÕES; PREVENÇÃO; DIAGNÓSTICO; INTERVENÇÃO**