



INCIDÊNCIA DE CATARATA PRÉ-SENIL POR DERMATITE ATÓPICA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

HENRIQUE TOFOLI VIEIRA MACHADO; MARIA VITORIA KRAHL; MARIANA DUARTE GARCIA BRITO; GEOVANA MENDES DE SEIXAS; GIOVANA MIZIARA CASTRO

Introdução: A catarata pré-senil é caracterizada pela opacificação do cristalino em indivíduos com menos de 50 anos. Fatores como predisposição genética, uso prolongado de corticosteroides e doenças sistêmicas podem influenciar o desenvolvimento dessa condição. A dermatite atópica (DA), uma doença inflamatória crônica da pele, está associada a complicações oculares, incluindo a formação precoce de catarata, especialmente em pacientes que fazem uso prolongado de corticosteroides. **Objetivo:** Avaliar a incidência de catarata pré-senil em pacientes com dermatite atópica no Sistema Único de Saúde (SUS), analisando fatores associados e propondo possíveis abordagens preventivas e terapêuticas para minimizar complicações. **Metodologia:** Revisão sistemática da literatura utilizando bases de dados como PubMed, SciELO e BVS, focando em artigos publicados nos últimos cinco anos. Os descritores utilizados incluíram "catarata pré-senil", "dermatite atópica", "corticosteroides", "opacificação do cristalino", "SUS", "Brasil" e "complicações oculares". Os critérios de inclusão foram artigos que descrevem a relação entre dermatite atópica e catarata em pacientes com menos de 50 anos no contexto de atendimento público de saúde no Brasil. Foram excluídos estudos com enfoque em outras doenças oculares ou realizados em sistemas de saúde privados. **Resultados:** Os estudos revisados indicam que pacientes com dermatite atópica têm um risco aumentado para catarata pré-senil, principalmente em função do uso prolongado de corticosteroides. No contexto do SUS, essa relação é significativa, devido à maior prevalência de DA em populações com menor acesso a tratamentos alternativos ou preventivos. Dados sobre a prevalência de catarata pré-senil em pacientes com DA atendidos no SUS são escassos, mas os relatos disponíveis sugerem que o uso inadequado de corticosteroides, associado à falta de acompanhamento especializado, contribui para o desenvolvimento dessa complicação. Além disso, a dermatite atópica severa, com episódios recorrentes de inflamação ocular, parece acelerar a opacificação do cristalino. **Conclusão:** A dermatite atópica, especialmente em pacientes dependentes de corticosteroides, está fortemente associada ao aumento da incidência de catarata pré-senil. A falta de monitoramento contínuo e de alternativas terapêuticas adequadas agrava esse quadro. É necessário investir em programas de educação continuada para profissionais de saúde e pacientes, promovendo o uso racional de corticosteroides e o acompanhamento oftalmológico regular.

Palavras-chave: **CORTICOSTEROIDES; OPACIFICACAO DO CRISTALINO; SAUDE PUBLICA; OFTALMOLOGIA; DOENCAS INFLAMATORIAS**