



PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS DOENÇAS DIARREICAS AGUDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA SOB A JURISDIÇÃO DO 7º CRS, NA ILHA DO MARAJÓ I, ESTADO DO PARÁ, NO ANO DE 2023

IVETE DA SILVA PEREIRA FILGUEIRA; IANE RAQUEL BARATA GUIMARÃES;
ANDERSON COSTA GOÊS; VIVIANE DOS SANTOS VIANA DE ALMEIDA; YGOR YURI
PEREIRA DA SILVA

Introdução: As Doenças Diarreicas Agudas são caracterizadas pela diminuição da consistência fecal, aumento da quantidade de evacuações, com no mínimo três episódios em 24h e por seu aparecimento repentino (BRASIL, 2024). Ela pode acometer indivíduos de qualquer faixa etária, mas é entre o público infantil que esta doença pode causar maior mortalidade, é a terceira causa mais comum de doença entre crianças dos países subdesenvolvidos e responsável por aproximadamente um terço de todas as hospitalizações entre os menores de cinco anos (PEREIRA, CABRAL, 2008). **Objetivo:** Analisar o perfil epidemiológico de Doenças Diarreicas Agudas na população do município de São Sebastião da Boa Vista - PA, no ano de 2023. **Materiais e Métodos:** O estudo foi realizado através de dados oriundos do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e da base de dados registradas no Sistema Informatizado de Vigilância Epidemiológica do Monitoramento das Doenças Diarreicas Agudas (SIVEP-DDA), autorizados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará. As variáveis adotadas foram faixa etária, sexo e cor, plano de tratamento e internações por diarreia. **Resultados:** A faixa etária prevalente dos casos de diarreia foi a de 0 a 9 anos (44%), enquanto a faixa etária acima de 10 anos alcançou o índice de 40%, sendo 16% dos casos não sinalizaram a idade (ignorados). Além disso, o plano de tratamento prevalente foi o C (52%) destinado aos pacientes com diarreia e desidratação grave, seguido do plano de tratamento B (31%) direcionado aos pacientes em observação clínica, tratados com solução de reidratação oral (SRO). As internações foram frequentemente registradas envolvendo crianças de 0 a 9 anos (48%), sexo feminino (56%) e cor parda (98%). **Conclusão:** Conclui-se que há necessidade da efetivação de políticas públicas de saúde que visem a prevenção e controle das doenças diarreicas, principalmente entre o público infantil, identificado como mais vulnerável, com um considerado índice no número de casos e internação. Estas políticas públicas teriam enfoque na melhoria das condições de saneamento básico, promoção de educação em saúde, abordando a importância dos hábitos de higiene pessoal, manipulação adequada dos alimentos, além do incentivo ao aleitamento materno exclusivo.

Palavras-chave: **DIARREIA; SAÚDE PÚBLICA; EPIDEMIOLOGIA; SANEAMENTO BÁSICO; EDUCAÇÃO EM SAÚDE**