



NECESSIDADE DE TRATAMENTO DA CÁRIE INVESTIGADA POR MEIO DO ÍNDICE CPO-D EM ADOLESCENTES

VANESSA MARIA DOS SANTOS DA SILVA; RODRIGO DALLA PRIA BALEJO; ANA PAULA MUNHOZ FAGUNDES

Introdução: Na adolescência, a cárie dentária e as doenças periodontais são comuns, influenciadas por fatores como dieta cariogênica e alterações hormonais, afetam diretamente a microbiota bucal, sendo mais prevalentes em jovens socioeconomicamente desfavorecidos. O índice CPO-D (média de dentes permanentes cariados, perdidos e obturados), recomendado pela Organização Mundial da Saúde, é fundamental para avaliar a prevalência de cárie e a necessidade de tratamento odontológico, auxiliando no planejamento de ações em saúde bucal. **Objetivo:** Averiguar a necessidade de tratamento de cárie investigada por meio do índice CPO-D em adolescentes beneficiados pelo Programa Auxílio Brasil em uma Unidade de Saúde da Família de Campo Grande-MS. **Materiais e métodos:** O estudo foi realizado com 14 adolescentes de 15 a 19 anos beneficiados pelo Programa Auxílio Brasil, vinculados à unidade de saúde. Os dados foram coletados pela odontóloga da unidade por meio de questionário e exame intraoral utilizando a ficha adaptada do projeto técnico da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal de 2020. Foram analisados os índices CPO-D e identificadas as necessidades de tratamento para cárie. **Resultados:** Dos entrevistados, em relação à escolaridade e renda dos pais, 44% não concluíram o ensino fundamental e 88% possuíam renda familiar de até um salário mínimo. Sobre alimentação, 85% dos adolescentes relataram consumir verduras e legumes, sendo que 42,6% ingeriam diariamente. Todos os entrevistados consumiam guloseimas, com 36% de consumo semanal. Na categoria odontológica, todos os adolescentes necessitavam de algum tipo de tratamento. O índice CPO-D médio foi de 3,42, caracterizado como prevalência moderada de cárie, com maior frequência de dentes cariados e obturados. Quanto às necessidades de tratamento, 92% necessitavam de aplicação de selante, 85% restauração de uma superfície, 28% restauração de duas ou mais superfícies, 28% coroa por qualquer razão, 7% tratamento pulpar seguido de restauração, 21% indicação de extração dentária e 7% de remineralização de manchas brancas. **Conclusão:** A pesquisa pode auxiliar a identificar as necessidades odontológicas relacionadas à cárie, contribuindo para o planejamento de ações e serviços de saúde bucal. Os resultados ressaltam a importância de ampliar políticas públicas como a inclusão da saúde bucal como condicionalidade para o recebimento do auxílio financeiro.

Palavras-chave: Saúde bucal do adolescente, Programa auxílio brasil, Cárie dentária.