



FATORES DE RISCOS RELACIONADOS A MALÁRIA NA LOCALIDADE DE TIMBÓ – CAMETÁ/PA

MÁRCIA DE ALMEIDA; TATIANE FARIAS DE ALMEIDA; CLAUDIO FARIAS DE ALMEIDA JUNIOR; ELIELMA DOS SANTOS SOUSA; JAMILE VITÓRIA MOREIRA DE ALMEIDA

Introdução: A malária é uma doença infecciosa febril aguda que geralmente ocorre nas camadas sociais mais pobres, sem condições adequadas de moradia, trabalho, educação e serviços sanitários. **Objetivo:** Nesse sentido, o presente estudo objetivou analisar a ocorrência da malária associada aos fatores de riscos na localidade de Timbó, situada no interior do município de Cametá/PA. **Metodologia:** O desenvolvimento da pesquisa deu-se sob a abordagem combinada quantitativa. Como instrumento para o levantamento dos dados utilizou-se um questionário socioeconômico/ambiental. Dos 103 habitantes da localidade, foram entrevistados 61 moradores acometidos por malária, correspondendo a aproximadamente 59% da população. **Resultados:** Como resultado, obteve-se que 64% dos entrevistados compreendiam ao sexo masculino e 36% ao feminino. A faixa etária dos 15 aos 45 anos foi a mais representativa (75,67%). Quanto ao tempo de moradia, 53 pessoas (86,8%) disseram que moravam no local a mais de 5 anos. Chamou a atenção a baixa escolaridade, visto que 41,73% dos participantes, possuem apenas o ensino fundamental incompleto. A renda mensal predominante estende-se de 0,5 a 1 salário mínimo, apontada por 31 pessoas. Por conseguinte, 49 moradores (86%) informaram que tem por principal ocupação o trabalho rural. Constatou-se que 39 moradores (63,9%) residiam em casas de madeira. E, 57 entrevistados (93,4%) afirmaram adentrar às matas diariamente. Observou-se que a variável renda está intimamente ligada a principal atividade econômica dos entrevistados que é agricultura, voltada para produção de roças. Na transmissão da malária, o tipo de moradia merece destaque porque habitações com precárias condições de moradia facilitam a transmissão da doença. Além disso, culturalmente, no horário crepuscular, os moradores se deslocam para o interior das matas, para as roças e/ou estão reunidos na casa do forno, local onde se produz a farinha, coincidindo com a atividade exoflica do mosquito, estando em lugares propícios a contrair a malária. **Conclusão:** Ao analisar-se o cenário, conclui-se que associados as atividades de trabalho e as condições de moradia, identificou-se que há correlação entre a malária e os fatores de riscos econômicos e socioculturais relativos à exposição dos moradores aos mosquitos do gênero *Anopheles*, principais vetores do *Plasmodium*, protozoário causador da malária.

Palavras-chave: Timbó, Fatores de risco, Malária.