PREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO ASSOCIADOS A INFECÇÃO PELO PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV) EM MULHERES SUBMETIDAS AO PCCU NA CIDADE DE BELÉM-PA

MAYARA NERINA FORTES ARTHUR; JOSIELLEM DAMASCENO DE SOUZA; ALDIR DOS SANTOS PEREIRA; JACQUELINE CORTINHAS MONTEIRO

INTRODUÇÃO: O câncer de colo de útero apresenta altos índices de morbimortalidade no Brasil. Fatores de risco auxiliam no desenvolvimento de lesões pré-malignas do colo uterino, dentre os quais destacam-se as condições socioeconômicas e sociocomportamentais, e a infecção pelo Papilomavírus humano (HPV). O HPV infecta diferentes regiões do corpo incluindo a mucosa e está presente em mais de 90% de todos os cânceres de colo do útero invasivo. **OBJETIVO:** Analisar e descrever a prevalência de HPV, o perfil socioeconômico e comportamental, e os comportamentos e fatores de risco associados à infecção em grupo de mulheres adolescentes e adultas jovens que realizaram coleta para preventivo do câncer de colo de útero (PCCU). **METODOLOGIA:** Foram coletadas amostras cévico-uterinas de mulheres submetidas ao PCCU na Unidade Básica de Saúde, na cidade de Belém, Pará. Os resultados citológicos foram cedidos pela unidade de saúde. Os dados socioeconômicos e comportamentais foram obtidos a partir de um questionário epidemiológico aplicado no momento da coleta de material. A pesquisa de HPV foi realizada através da técnica de *nested-PCR* usando-se primers MY09/MY11 e GP06/GP05. Para a correlação dos dados epidemiológicos e a infecção pelo HPV aplicou-se o Teste Exato de *Fisher*. De um total de 76 amostras, nenhuma apresentou citologia atípica. **RESULTADOS:** A prevalência global da infecção pelo HPV foi de 19,74% (15/72). A maioria das mulheres infectadas tinham idade igual ou inferior a 23 anos (66,7%), eram casadas (60%), e possuíam baixa escolaridade (66,7%). Dentre as variáveis epidemiológicas, a renda mensal (p=0.0015) e o tabagismo (p=0.0525) estiveram relacionados à infecção por HPV. **CONCLUSÃO:** A prevalência da infecção pelo HPV esteve de acordo com os dados regionais. Os dados obtidos nesse estudo Sugerem um investimento em iniciativas de educação em saúde da população, de forma que criem estratégias adequadas, com o intuito de promover à promoção da saúde da mulher, educação sexual de jovens e adolescentes, bem como a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, tendo em vista que o HPV é transmitido, por via sexual e apresenta potencial oncogênico.

Palavras-chave: Câncer de colo de útero, Fatores de risco, Papilomavírus humano, Pccu, Saúde da mulher.

DOI: 10.51161/iii-conbramol/10827