



OBSTRUÇÃO URETRAL EM UM FELINO MACHO: RELATO DE CASO

AMANDA FERREIRA-GIANLUPPI; CAELIZA THAINÁ ARAÚJO-BRITO; ANA LETICIA FILIZZOLA VASCONCELOS; HELOISA PINTO DE GODOY SIQUEIRA; ANDRÉ BUZUTTI DE SIQUEIRA

Introdução: A Doença do trato urinário inferior felino (DTUIF) é caracterizada por um processo inflamatório das vias urinárias inferiores, podendo ser associada a cristais ou cálculos, ou a agentes infecciosos, traumas, neoplasias e fatores idiopáticos. Gatos acometidos geralmente são machos, castrados, obesos e sedentários, alimentando-se de ração seca e ingerindo pouca água. Manifestações incluem hematúria, disúria e obstrução uretral. A obstrução, se não tratada, pode levar a desequilíbrios sistêmicos e morte, sendo a uretostomia perineal uma opção cirúrgica. **Objetivo:** O objetivo desse trabalho foi relatar o caso de um felino, macho, de 5 anos de idade, que apresentava anorexia, inapetência e estrangúria. **Relato de caso:** Um felino macho SRD, castrado, 5 anos, 3,8kg, com anorexia, inapetência e estrangúria sem micção por um dia, foi atendido em Boa Vista, Roraima. Alimentado com ração seca e pouca água, havia fugido de casa recentemente. No exame físico, apresentou desidratação moderada, pênis hiperêmico e edemaciado, desconforto na vesícula urinária repleta e distendida, indicando obstrução uretral. Recebeu fluidoterapia IV, hemograma completo e análises bioquímicas. A desobstrução foi feita com anestesia, tricotomia perineal, antisepsia, massagem peniana, cateter 22G lubrificado com lidocaína 2% e hidropulsão com solução salina. A vesical foi lavada até solução límpida, sem fixação da sonda. Observado por 24h, recebeu alta com instruções para alteração de ração e aumento de consumo de água. Após 25 dias, retornou com recidiva, sendo realizada uretostomia perineal. Pós-operatório incluiu fluidoterapia, meloxicam, dipirona e enrofloxacina. Com recidiva e estenose, nova correção cirúrgica foi feita. Após internação e observação, recebeu alta com enrofloxacina e meloxicam. Com cuidados contínuos, a cicatrização foi completada após 10 dias. **Conclusão:** A uretostomia perineal mostrou-se eficaz para tratar a obstrução uretral recorrente em felinos, proporcionando alívio dos sintomas e recuperação completa após 10 dias de cuidados pós-operatórios. A mudança na alimentação e o aumento da ingestão de água são essenciais para prevenir novas obstruções e garantir o bem-estar do animal.

Palavras-chave: **ESTENOSE; GATO; OBSTRUÍDO; ; URETRA; URINÁRIO**