



CORREÇÃO CIRÚRGICA DE ENTRÓPIO BILATERAL EM FELINO DA RAÇA MAINE COON- RELATO

CAMILA DO NASCIMENTO CORDEIRO SENA; ARIEL DE ALMEIDA COELHO; SÁVIO MATHEUS REIS DE CARVALHO

Introdução: O entrópio é uma condição em que a margem da pálpebra se dobra para dentro, fazendo com que os cílios e a pele irrite a superfície ocular. Sua correção é cirúrgica, e delicada, tendo como principais complicações a correção insuficiente ou exagerada podendo causar ectrópio. A etiologia dessa patologia pode ser espástica, congênita ou até mesmo cicatricial. O entrópio é uma condição rara em felinos, porém gatos da raça persa tem uma maior predisposição. Já os cães são frequentemente acometidos. **Objetivo:** Relatar um caso de correção cirúrgica de entrópio bilateral em felino da raça Maine Coon. **Relato de Caso:** O animal em questão é um felino de 1 ano de idade e pesando aproximadamente 5kg. Esteve presente no hospital veterinário particular de Teresina para cirurgia correção de entrópio. O procedimento cirúrgico envolveu a técnica de Hotz-Celsus, na qual uma porção da pele da pálpebra foi removida para permitir que a mesma se reposicionasse corretamente. Foi realizada a anestesia geral, e o paciente foi monitorado frequentemente para garantir a estabilidade durante o procedimento. Foi realizada a incisão de margem palpebral e na extensão do entrópio, retirada a pele, em seguida realizada a síntese das margem com sutura simples separada, foi utilizado fio Polidioxanona 3.0 para sutura. O pós operatório ocorreu como previsto, o animal permaneceu em observação e foi liberado após algumas horas da recuperação anestésica. Foi prescrito analgésico e antibióticos além da utilização do colar elisabetano para evitar que o felino lesionasse a área operada, comprometendo a cicatrização. Durante o seu período de recuperação, foi relatado pelo tutor que o felino apresentava comportamentos normais, com apetite e níveis de atividade mantido, sem sinais de complicações, infecções ou deiscência dos pontos. O felino retornou ao hospital cerca de duas semanas depois do procedimento para retirada dos pontos, e através do exame físico foi possível confirmar que a cirurgia de correção foi bem-sucedida e os cuidados pós-operatórios eficazes. **Conclusão:** Concluímos que a técnica de Hotz-Celsus apresenta uma grande eficácia na correção de entrópio, sendo essa feita corretamente e sendo respeitado todos os cuidados e tratamento pós cirúrgico.

Palavras-chave: **CICATRIZAÇÃO; CIRURGIA; ; EXAME; INCISÃO; PÁLPEBRA**