



CARCINOMA HEPATOCELULAR TRABECULAR BEM DIFERENCIADO EM UM CÃO - RELATO DE CASO

LEONICE FERNANDES DE SOUSA; SÁVIO MATHEUS REIS DE CARVALHO; REBECCA INGRYD COELHO DE FREITAS; NATÁLIA SILVA LEITE ROCHA

Introdução: O carcinoma hepatocelular trabecular (CHT) é uma neoplasia primária, maligna e invasiva que pode causar anorexia, letargia, perda de peso, polidipsia, poliúria, vômito e distensão abdominal. Essa neoplasia é incomum em caninos e rara em felinos, afetando principalmente animais entre sete e quinze anos de idade, sendo os machos mais suscetíveis. O tratamento mais recomendado é a remoção cirúrgica do tumor.

Objetivo: O objetivo deste relato é apresentar um caso de uma paciente canina idosa diagnosticada com carcinoma hepatocelular trabecular, tratada com hepatectomia (cirurgia que consiste na remoção parcial ou total do fígado). **Relato de caso:** Uma cadela, Bulldog Francês, de 9 anos de idade, foi admitida em um hospital veterinário em Teresina-PI, apresentando crises de vômito, hematoquezia com muco e hiporexia. Os exames laboratoriais não mostraram alterações significativas, exceto por discreta hipoalbuminemia (2,5 g/dL). A ultrassonografia abdominal revelou aumento do tamanho do fígado, que apresentava características hipoeecogênicas, com uma formação discretamente hiperecogênica, pouco delimitada, na região do lobo quadrado, medindo aproximadamente 3,2 x 2,3 cm, com indícios de vascularização periférica ao Doppler. A paciente foi encaminhada para o centro cirúrgico para realização de hepatectomia parcial. O fragmento excisado, de aspecto grosseiro e coloração escurecida, foi enviado para exame histopatológico, confirmando a presença de CHT bem diferenciado. Até 45 dias após a cirurgia, não foram observados indícios de complicações pós-cirúrgicas ou recidivas. Apesar de ser um tumor maligno e invasivo, cães com CHT geralmente apresentam sinais vagos de disfunção hepática. **Conclusão:** Assim, destaca-se a importância do acompanhamento dos sinais clínicos associados à avaliação ultrassonográfica para diagnóstico precoce, bem como a eficácia do tratamento cirúrgico.

Palavras-chave: ; CANINO; HEPATOTECTOMIA; NEOPLASIA CANINA; NEOPLASIA HEPÁTICA; TUMOR