



URETEROTOMIA MICROCIRÚRGICA: RELATO DE 6 CASOS

GABRIELA GOMES DE MELO; LUIZA MELO VIANNA; JORDANA BRITES JERONIMO;
BEATRIZ SOUZA COSTA; ANDRÉ LACERDA DE ABREU OLIVEIRA

Introdução: As complicações ureterais podem ocorrer por diversos fatores, incluindo obstruções por ureterolitíases, que podem levar à obstrução do fluxo urinário e complicações mais graves como hidroureter e hidronefrose. Os principais sinais clínicos incluem hipofagia, vômitos, disúria e hematúria. O diagnóstico é feito através do histórico, sinais clínicos, exames laboratoriais e exames de imagem. Uma das técnicas cirúrgicas mais utilizadas para o tratamento é a ureterotomia. **Objetivo:** O presente trabalho visa relatar 6 casos ocorridos no Setor de Cirurgia do Hospital Veterinário da UENF, onde ambos os pacientes apresentaram sinais clínicos compatíveis com tal alteração. **Relato de caso:** No primeiro caso, uma cadela de 12 anos, SRD, apresentou leucocitose, aumento de ureia, creatinina, ALT e FA, hidronefrose em rim esquerdo, cálculos em vesícula urinária e ureter esquerdo, dilatação de ureter e pelve esquerda. No segundo caso, de uma cadela de 1 ano, shih-tzu, foram encontrados nos exames laboratoriais neutrofilia absoluta e trombocitopenia. Na ultrassonografia as imagens foram sugestivas de urolitíase, além de apresentar hidronefrose em pelve e ureter. No terceiro caso, outra cadela de 5 anos, spitz alemão, apresentou leucocitose neutrofílica com DNNE leve, FA e GGT aumentadas, cálculo em ureter direito e dilatação da pelve renal direita. No caso 4, uma gata, PCB, idosa, apresentou linfocitopenia absoluta, aumento de ureia e creatinina, nefropatia crônica bilateral com nefrolitos e obstrução ureteral por cálculos urinários. No caso 5, um gato de 2 anos, PCB, demonstrou alterações como hipocalcemia, hiperproteinemia, azotemia, hidronefrose bilateral com presença de microlitíase em ambas as pelves renais, litíase em ureter esquerdo e nefromegalia. No caso 6, uma gata de 3 anos, apresentou aumento de ureia, creatinina, potássio e fosforo. Na ultrassonografia notou-se imagem sugestiva de nefropatia, hidronefrose, pielolitíase, nefrolitíase em rim esquerdo e litíase em ureter esquerdo. **Conclusão:** Todos os pacientes foram submetidos a microcirurgia com ampliação microscópica, onde foi realizado o acesso cirúrgico na linha média do abdômen e localizado o ureter, que foi dissecado e isolado. Prosseguida da incisão longitudinal na localização do urólito para sua retirada e seguida de ureterorrafia microcirúrgica em um padrão simples interrompido, com fio absorvível monofilamentar 10-0.

Palavras-chave: **CÁLCULO; NEFROPATIA; ; RENAL; URETER; URETEROLITÍASE**